VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL VIH EN ESPAÑA 2025

ACTUALIZACIÓN 30 de junio de 2026

SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH

DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD PÚBLICA Y EQUIDAD EN SALUD

SISTEMAS AUTONÓMICOS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Noviembre 2026

Citación sugerida:

Unidad de vigilancia de VIH, ITS y hepatitis. Vigilancia Epidemiológica del VIH en España 2025: Sistema de Información sobre Nuevos Diagnósticos de VIH. Centro Nacional de Epidemiología. Instituto de Salud Carlos III/ División de control de VIH, ITS, Hepatitis virales y tuberculosis. Ministerio de Sanidad. Madrid; noviembre 2026.

CC BY-NC-SA 4.0

Contenido

1. RESUMEN EJECUTIVO 6

2. INTRODUCCIÓN 8

3. NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN ESPAÑA 8

3.1 METODOLOGÍA **8**

3.2 RESULTADOS **9**

3.2.1 NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN EL AÑO 2025 9

3.2.2 TENDENCIAS DE LOS NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH 2013-2025 10

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES 12

TABLAS **13**

FIGURAS **23**

Tablas

Tabla 1: Nuevos diagnósticos de infección por el VIH: número de casos y tasa 100.000 habitantes. España. Años 2003-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación 13

Tabla 2: Nuevos diagnósticos de infección por el VIH. Número de casos, porcentaje y tasas por sexo, edad y modo de transmisión. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación 14

Tabla 3: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por CCAA de notificación y modo de transmisión. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación 15

Tabla 4: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por sexo y zona geográfica de origen. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación 16

Tabla 5: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por zona geográfica de origen y modo de transmisión. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación 16

Tabla 6: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por modo de transmisión y zona geográfica de origen. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación 17

Tabla 7: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año de diagnóstico y sexo. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 18

Tabla 8: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año de diagnóstico y grupo de edad. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 19

Tabla 9: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año de diagnóstico y modo de transmisión. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 20

Tabla 10: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año de diagnóstico, modo de transmisión y sexo. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 21

Tabla 11: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año y zona geográfica de origen. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 22

Figuras

Figura 1. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por edad y sexo. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 23

Figura 2. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 23

Figura 3. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión y sexo. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 24

Figura 4. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión según grupos de edad. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 24

Figura 5. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por zona geográfica de origen. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 25

Figura 6. Nuevos diagnósticos de VIH según zona geográfica de origen por grupos de edad. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 25

Figura 7. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión según zona geográfica de origen. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 26

Figura 8. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por zona geográfica de origen según modo de transmisión. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 26

Figura 9. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 27

Figura 10. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según sexo. España, año 2025.Datos no corregidos por retraso en la notificación. 27

Figura 11. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según grupo de edad. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 28

Figura 12. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según zona geográfica de origen. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 28

Figura 13. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según modo de transmisión en pacientes con diagnóstico tardío. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 29

Figura 14. Nuevos diagnósticos de VIH anuales totales y según sexo. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 29

Figura 15. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales, totales y según sexo. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación. 30

Figura 16. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales según modo de transmisión. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación. 30

Figura 17. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y sexo. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación. 31

Figura 18. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH en HSH, por año de diagnóstico y grupos de edad. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en notificación. 31

Figura 19. Número y porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH según región de origen. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 32

Figura 20. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación. 32

Figura 21. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación (Hombres) 33

Figura 22. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación (Mujeres) 33

Figura 23. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío (<350 CD4) según año de diagnóstico y modo de transmisión, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación 34

Figura 24. Mediana del recuento de CD4 al diagnóstico de VIH por modo de transmisión. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación. 34

1. RESUMEN EJECUTIVO

OBJETIVOS:

- Cuantificar los nuevos diagnósticos de infección por el VIH en 2025 así como su evolución temporal.
- Describir las características epidemiológicas de las personas recientemente diagnosticadas de infección por VIH.
- Contribuir a la vigilancia epidemiológica internacional de la infección por el VIH.

NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH.

Metodología:

Se han incluido todos los nuevos diagnósticos de VIH notificados en las comunidades autónomas (CCAA) de Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta desde el año 2003; en Galicia desde el año 2004; en Madrid desde el 2007; en Aragón, Castilla La Mancha y la ciudad autónoma de Melilla desde el 2008; en Cantabria, Castilla y León y Murcia desde el año 2009, en la Comunidad Valenciana desde 2012 y en Andalucía desde el 2013. La población cubierta ha ascendido progresivamente desde el 34,5% en 2003 hasta alcanzar el 100% a partir del año 2013.

Los datos presentes en este informe pueden diferir de los reflejados en los informes de las CCAA debido a diferentes periodos de actualización.

Se ha definido "diagnóstico tardío" (DT) como la presencia de una cifra de CD4 inferior a 350 células/µl en la primera determinación tras el diagnóstico de la infección por VIH y enfermedad avanzada (EA) la presencia de una cifra inferior a 200 células/µl.

Principales resultados:

Año 2025: Se notificaron 3.239 nuevos diagnósticos de VIH, lo que supone una tasa de 6,59/100.000 habitantes sin corregir por retraso en la notificación. Tras corregir por este retraso, se estima que la tasa para 2025 será de 6,89 por 100.000 habitantes cuando se haya completado la notificación de todos los diagnósticos realizados ese año.

El 82,7% eran hombres y la mediana de edad fue de 36 años (rango intercuartílico: 29-46). La transmisión en hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres (HSH) fue la más frecuente, 46,9%, seguida de la heterosexual, 27,8%, y la que se produce en personas que se inyectan drogas (PID), 1,5%. El 54,0% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH se realizó en personas originarias de otros países. El 49,9% de los nuevos diagnósticos presentaron diagnóstico tardío.

Periodo 2013-2025: La tendencia en las tasas totales y por sexo es descendente en el periodo. Según modo de transmisión, se aprecia un descenso en las tasas en PID a nivel global y en ambos sexos. En los casos de transmisión heterosexual también se observa una tendencia descendente significativa a nivel global; en las mujeres heterosexuales esta tendencia se aprecia a partir de 2016. Las tasas de nuevos diagnósticos en HSH muestran una tendencia descendente entre 2016-2025. Desagregando por origen, en los HSH españoles se observa el descenso significativo entre 2016 y 2025, mientras que en los HSH procedentes de otros países se observa una estabilización entre 2018 y 2025. Entre los diagnósticos atribuidos a transmisión heterosexual, la tendencia es descendente entre los españoles entre 2013 y 2025 y en los casos nacidos en otros países está estabilizada. En el caso de las PID, se observa un descenso significativo en la tasa tanto en españoles como en los casos de otros países en el periodo estudiado.

El porcentaje de personas diagnosticadas cuyo país de origen no era España osciló entre el 31,3% en 2013 y el 53,9% en 2025. El porcentaje de casos con diagnóstico tardío ha aumentado tanto a nivel global como en HSH, sin observarse cambios en heterosexuales ni en PID.

CONCLUSIONES:

- La tasa de nuevos diagnósticos de VIH es similar a las de otros países de Europa Occidental, aunque superior a la media de los países de la Unión Europea.
- La vía sexual es el modo de transmisión principal en los nuevos diagnósticos de VIH y la transmisión entre HSH es la mayoritaria.
- Las personas de otros países de origen suponen una parte relevante de los nuevos diagnósticos.
- El diagnóstico tardío es elevado y aumenta con la edad al diagnóstico, es mayor en personas nacidas fuera de España, así como en aquellas personas que adquirieron la infección por VIH a través de relaciones heterosexuales o uso de drogas inyectadas.
- La tendencia en las tasas de nuevos diagnósticos de VIH, tanto global como por sexo, es descendente en el periodo analizado.
- El descenso en los casos y tasas en 2020 puede estar afectado por la pandemia de COVID-19.

2. INTRODUCCIÓN

La planificación de la respuesta a la epidemia de infección por VIH requiere disponer de información sistemática sobre distintos aspectos, por lo que es preciso implantar sistemas de información epidemiológica con objetivos específicos y centrados en diversas subpoblaciones. Entre estos sistemas ocupa un lugar clave la recogida de información poblacional sobre nuevos diagnósticos de VIH.

En España, el sistema de información sobre nuevos diagnósticos de VIH (SINIVIH) proporciona información sobre todos los nuevos diagnósticos de la infección que se producen en un territorio determinado. Actualmente, los datos obtenidos a través de este sistema son la mejor aproximación a la incidencia de VIH de que se dispone, aunque, por ser la infección asintomática, los nuevos diagnósticos de VIH incluyen no sólo infecciones recientes, sino también otras que se produjeron años atrás. La cobertura del SINIVIH alcanza el 100% de la población española a partir del año 2013.

El Registro Nacional de casos de sida recoge información sobre los nuevos diagnósticos de casos de sida en España desde el inicio de la epidemia y proporciona información sobre la infección avanzada por VIH. En 2025 se ha discontinuado la recogida de casos de sida tal y como se venía realizando, y a partir de la fecha solo se recogerán los casos de sida concurrentes con el diagnóstico de infección por el VIH tal y como queda reflejado en el protocolo de vigilancia. Por ese motivo, en el presente informe no se presentan datos sobre casos de sida.

3. NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN ESPAÑA

3.1 METODOLOGÍA

Este informe incluye los datos aportados por los sistemas de vigilancia de nuevos diagnósticos de infección por el VIH de las comunidades autónomas (CCAA) de Asturias, Baleares, Canarias, Cataluña, Extremadura, La Rioja, Navarra, País Vasco y la ciudad autónoma de Ceuta desde el año 2003; de Galicia desde el año 2004; de Madrid desde el 2007; de Aragón, Castilla La Mancha y la ciudad autónoma de Melilla desde el 2008; de las comunidades de Cantabria, Castilla León y Murcia desde el año 2009; de la Comunidad Valenciana desde 2012 y de Andalucía desde el año 2013. Por tanto, la población cubierta por este sistema de vigilancia ha ascendido progresivamente, desde el 34,5% en 2003 hasta alcanzar el 100% del total de la población nacional a partir del año 2013.

Dentro de las CCAA se ha realizado una depuración de duplicados, pero no ha sido posible evaluar si existen datos duplicados entre CCAA, ya que los registros agregados a nivel nacional carecen de identificadores para hacerlo. Los datos presentes en este informe pueden diferir de los reflejados en los informes de las CCAA debido a diferentes periodos de actualización.

Como aproximación al diagnóstico tardío (DT) se ha utilizado la cifra de linfocitos CD4 en la primera determinación que se realiza tras el diagnóstico. Se considera DT la presencia de una cifra inferior a 350 células/µl; y enfermedad avanzada (EA) la presencia de una cifra inferior a 200 células/µl.

Se realizó un análisis descriptivo de los datos y el cálculo de las tasas de nuevos diagnósticos de VIH/100.000 habitantes. Se ha utilizado la población estimada con fecha a 1 de enero según la operación Estadística Continua de Población que publica anualmente el Instituto Nacional de Estadística. Para el cálculo de las tasas por modo de transmisión también se utilizó como denominador la población general, excepto para su cálculo en el caso de hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres (HSH), donde se utilizó la población masculina.

3.2 RESULTADOS

Desde el año 2003, y con las sucesivas incorporaciones al sistema, se han notificado un total de 78.887 nuevos diagnósticos de infección por VIH. Las tasas anuales de nuevos diagnósticos por 100.000 habitantes, sin ajustar por retraso de notificación, oscilaron entre 12,80 en 2008 y 6,38 en 2020 (Tabla 1).

3.2.1 NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH EN EL AÑO 2025

Hasta el 30 de junio de 2026 se ha recibido la notificación de 3.239 nuevos diagnósticos de VIH en el año 2025, lo que representa una tasa de 6,59 por 100.000 habitantes sin ajustar por retraso en la notificación. Tras corregir por este retraso, se estima que la tasa para 2025 será de 6,89 por 100.000 habitantes cuando se haya completado la notificación de todos los diagnósticos realizados ese año.

Sexo y edad

Los hombres suponen el 82,7% de los nuevos diagnósticos de VIH (Figura 1) y las tasas correspondientes para hombres y mujeres fueron 11,1 y 2,2/100.000 respectivamente (Tabla 2).

La mediana de edad al diagnóstico de VIH fue de 36 años (rango intercuartílico (RIC): 29-46), siendo más jóvenes los hombres (35 años; RIC: 28-45) que las mujeres (39 años; RIC: 31-48).

El 33,9% de los nuevos diagnósticos se encuentran en el grupo de edad de 25 a 34 años. Un 27,5% (881 casos) tenía menos de 30 años en el momento del diagnóstico de VIH. El 11,2% tenía entre 15 y 24 años y el 18,3% tenía 50 años o más (Tabla 2). La tasa específica por edad más alta se produjo en el grupo de edad de 30 a 34 años (20,2 casos por 100.000 habitantes) (Tabla 2).

Modo de transmisión

La transmisión en hombres que tienen sexo con hombres (HSH) fue la más frecuente, 46,9%, seguida de la transmisión heterosexual, que supuso un 27,8%, y la ocurrida en personas que se inyectan drogas (PID), que sumó un 1,5% (Tabla 2, Figura 2). Por tanto, el 74,7% de los nuevos diagnósticos de VIH en 2025 fueron de transmisión sexual. En cuanto a las tasas por modo de transmisión, resumidas en la tabla 2, se aprecia como la incidencia de nuevos diagnósticos de VIH en HSH es superior a la de los otros grupos de población. La distribución de los nuevos diagnósticos según CCAA de notificación y modo de transmisión se presenta en la Tabla 3.

Desglosando el modo de transmisión según el sexo, entre los hombres la transmisión en HSH supone el 56,7% de los nuevos diagnósticos de VIH y la transmisión heterosexual el 19,0%. Entre las mujeres, la transmisión heterosexual constituye la gran mayoría, con un 70,4% de los nuevos diagnósticos (Figura 3).

La transmisión en HSH es la más frecuente en todos los grupos de edad, a excepción de aquellos entre 40-49 años (37,8%) y de 50 o más años (29,0%). Se observa que a partir de los 40 años el porcentaje de casos en los que no consta información respecto al modo de transmisión va aumentando (Figura 4).

Lugar de origen

En el año 2025, el 54,0% de los nuevos diagnósticos de infección por el VIH se realizó en personas originarias de otros países. Tras los españoles, el origen más frecuente fue el latinoamericano (36,0%) (Figura 5). Cabe destacar que en el caso de las mujeres el 65,8% de los nuevos diagnósticos habían nacido fuera de España (Tabla 4).

El porcentaje de los nuevos diagnósticos según región de origen fue diferente en cada grupo de edad. En 2025, los casos nacidos en otros países supusieron más del 50% de los nuevos diagnósticos de VIH de 15 a 39 años. Conforme aumentó el grupo de edad al diagnóstico, se incrementaron también los casos nacidos en España

(desde el 37,2% de aquellos entre 15 y 24 años hasta el 52,4% de los de 50 o más años) y decrecieron los nuevos diagnósticos en los nacidos en Latinoamérica (43,3% entre 15-24 años y 21,4% en los de 50 o más años); para el resto de zonas de origen las variaciones fueron menos marcadas (Figura 6).

Al comparar las distintas regiones de origen según modo de transmisión, se observa que, en los casos procedentes de Latinoamérica y Europa Occidental, al igual que en españoles, la transmisión entre HSH es la predominante (59,9%, 57,1% y 48,3% respectivamente). En los subsaharianos, en cambio, el 55,6% adquirió la infección a través de transmisión heterosexual, frente al 26,5% que representa en españoles (Tabla 5 y Figura 7).

Analizando por las diferentes vías de transmisión, se advierte que, en los casos de transmisión heterosexual, el 56,1% habían nacido fuera de España, principalmente en países de Latinoamérica (28,3%) y de África Subsahariana (14,3%). Del total de diagnósticos en HSH, el 41,5% habían nacido en España, el 46,0% eran originarios de Latinoamérica y el 2,9% de otros países de Europa Occidental (Tabla 6 y Figura 8).

Diagnóstico tardío y enfermedad avanzada

El 86,7% de los nuevos diagnósticos de VIH en el año 2025 disponían de información sobre la primera determinación de linfocitos CD4 realizada tras el diagnóstico (n=2.809). La mediana de CD4 fue de 350 (RIC: 172-545). El porcentaje de casos con EA fue del 28,7% y con DT de 49,9% (Figura 9). El DT fue mayor en mujeres que en hombres (53,3% frente a 49,2%), no siendo esta diferencia estadísticamente significativa (Figura 10). En relación con la edad, el DT aumenta conforme se incrementa la edad, siendo del 39,1% en los menores de 25 años y del 62,6% en los de 50 años o más (Figura 11).

La figura 12 muestra el porcentaje de casos con DT según el lugar de nacimiento, siendo más elevado en los procedentes de África Subsahariana (58,9%), Latinoamérica (53,6%) y África del Norte (53,3%) que en los españoles (44,0%).

Según modo de transmisión, el DT fue superior en los casos de transmisión heterosexual, tanto en hombres (57,7%) como en mujeres (50,4%), que en HSH (43,3%). Sin embargo, dado el peso que tienen los HSH en las cifras globales, constituyen el grupo más numeroso entre los casos de VIH con diagnóstico tardío (42,3% del total) (Figura 13).

3.2.2 TENDENCIAS DE LOS NUEVOS DIAGNÓSTICOS DE VIH 2013-2025

Los datos presentados en gráficos se han corregido por retraso en la notificación (a excepción de las figuras 14, 18, 19, 23 y 24). No se ha realizado la corrección por retraso en los datos que se presentan en tablas.

El número de casos notificados entre 2013 y 2025 fue de 49.970. Su distribución anual por sexo se refleja en la tabla 7 y figura 14 y la distribución por grupos de edad se muestra en la tabla 8. El porcentaje de mujeres osciló entre el 13,4 al 17,3% (Tabla 7). Las tasas de nuevos diagnósticos en hombres fueron muy superiores a las de las mujeres en todo el periodo. Tanto en la tasa global como en la tasa por sexos se observa un descenso entre 2013 y 2025 estadísticamente significativo (Figura 15).

El porcentaje de nuevos diagnósticos en HSH osciló entre el 60,5% en 2019 y el 46,9% en 2025; en varones heterosexuales se mantuvo en torno al 14% mientras que en las mujeres alrededor del 12%. El porcentaje de casos en PID disminuyó tanto globalmente como en hombres y mujeres (Tablas 9 y 10).

Según modo de transmisión, el análisis de las tendencias muestra un descenso en las tasas globales y en ambos sexos en PID durante el periodo de estudio. Las tasas de nuevos diagnósticos en HSH muestran una tendencia descendente entre 2016-2025. En los casos de transmisión heterosexual también se observa una tendencia descendente significativa de forma global; en las mujeres heterosexuales esta tendencia se aprecia a partir de 2016 (Figuras 16 y 17).

Por ser el grupo de HSH el mayoritario, se calcularon también para ellos las tasas por grupo de edad durante el periodo 2013-2025. Los resultados muestran una disminución en las tasas de nuevos diagnósticos entre 20 y 24, entre 25 y 29 años y 30-34 años desde 2017, y en los de 15 a 19 años y 35 a 49 años desde 2015. Las tasas en los de 50 o más años están estabilizadas (Figura 18).

El número de nuevos diagnósticos en personas de otros países de origen aumentó de 1.400 casos en 2013 a 1.749 en 2025. Este incremento junto con el descenso en el número total de casos hace que el porcentaje de personas diagnosticadas cuyo país de origen no es España aumente desde el 31,3% hasta el 53,9% en el periodo (Figura 19). Se observa un aumento porcentual de los nuevos diagnósticos procedentes de Latinoamérica sin cambios significativos en los procedentes de otras regiones (Tabla 11).

Al analizar las tasas por lugar de origen y modo de transmisión se aprecia que, tanto en españoles como en los nacidos en otros países las tasas son más altas en HSH durante todo el período de estudio. Entre los diagnósticos atribuidos a transmisión heterosexual, la tendencia es descendente entre los españoles entre 2013 y 2025 y en los casos nacidos en otros países está estabilizada. En el caso de las PID, se observa un descenso significativo en la tasa en españoles y en los casos de otros países en el periodo estudiado. Respecto a los HSH, de forma global las tasas descienden desde 2016. Desagregando por origen, en los HSH españoles se observa el descenso significativo entre 2016 y 2025, mientras que en los HSH procedentes de otros países se observa un incremento en las tasas entre 2013 y 2018 seguido de una estabilización entre 2018 y 2025 (Figura 20).

La estratificación por sexo, modo de transmisión y origen muestra que las tasas en PID disminuyen en hombres y en mujeres independientemente del lugar de origen. Las tasas de nuevos diagnósticos de transmisión heterosexual son decrecientes en hombres españoles en todo el periodo, mientras que en los hombres extranjeros se aprecia una estabilización; en las mujeres heterosexuales se observa un descenso en las tasas en el periodo de estudio tanto en españolas como en las de otros países de origen (Figuras 21 y 22).

Al analizar la evolución del porcentaje de DT, el porcentaje de casos con menos de 350 CD4 al diagnóstico se ha incrementado a nivel global y en HSH, mientras que en el resto está estabilizado. Al desagregar por modo de transmisión, el DT es mayor en hombres heterosexuales y menor en HSH en todo el periodo (Figura 23). La mediana del recuento de CD4 al diagnóstico desciende en los HSH en el periodo (Figura 24).

La distribución de los nuevos diagnósticos de VIH por año de diagnóstico y sexo, grupos de edad y modo de transmisión para el periodo 2013-2025 se presenta en las tablas 7-11.

4. RESUMEN Y CONCLUSIONES

Al interpretar los resultados de este informe hay que tener en cuenta la metodología utilizada que se refiere en los apartados correspondientes.

Teniendo en mente estas consideraciones, se pueden extraer las siguientes **conclusiones**:

- Actualmente la tasa global de nuevos diagnósticos de VIH en España está en niveles similares a los de otros países de Europa Occidental, aunque la tasa es superior a la media de la Unión Europea.
- La infección por VIH es una infección que se transmite mayoritariamente por vía sexual. Por ello, sin descuidar otras formas de transmisión, es necesario implantar y reforzar actuaciones eficaces para prevenir la transmisión por esta vía, adecuándolas a las circunstancias.
- Las relaciones sexuales no protegidas entre hombres ocupan el primer lugar en cuanto al mecanismo probable de infección en el conjunto global de datos. También son mayoría entre las personas nacidas en España y entre los varones, sean españoles o extranjeros en su conjunto. Por ello, el colectivo de HSH es prioritario para los programas de prevención.
- Las personas de otros países suponen más de la mitad de los nuevos diagnósticos de VIH en 2025. Las características diferenciales de los mismos hacen necesario diversificar los programas de prevención para adaptarlos a las necesidades de este colectivo, social y culturalmente muy heterogéneo, y especialmente vulnerable.
- En España la prueba del VIH es gratuita y confidencial para todos. Sin embargo, el 49,9% de las personas diagnosticadas de infección en 2025 presentaba un diagnóstico tardío y este porcentaje aumenta con la edad al diagnóstico, es mayor en personas nacidas fuera de España, así como en aquellas personas que adquirieron la infección por VIH a través de relaciones heterosexuales o uso de drogas inyectadas. Es esencial que la población y los profesionales sanitarios sean conscientes de que cualquier persona que realice prácticas de riesgo es vulnerable al VIH, y de la importancia de diagnosticar la infección lo antes posible.
- La tendencia de las tasas de nuevos diagnósticos de VIH es descendente entre 2013 y 2025. Según el modo de transmisión se observa una tendencia decreciente en PID y heterosexuales en todo el periodo, mientras que en HSH se observa esta tendencia a partir de 2016, con algunas diferencias según lugar de origen. El descenso en los casos y tasas en 2020 puede estar afectado por la pandemia de COVID-19.

TABLAS

Tabla 1: Nuevos diagnósticos de infección por el VIH: número de casos y tasa por 100.000 habitantes. España. Años 2003-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación

CCAA de notificación	Año de diagnóstico																							
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	TOTAL
BALEARES	156	146	154	187	151	212	192	187	159	180	172	149	157	171	168	131	133	127	124	104	121	151	179	3.611
CANARIAS	198	228	251	295	316	360	286	283	264	308	316	379	279	323	307	273	234	186	214	198	236	241	203	6.178
CATALUÑA	771	810	758	795	811	819	786	910	893	906	921	762	761	723	744	732	673	495	465	511	526	487	437	16.496
CEUTA	1	5	6	3	1	2	0	2	1	1	3	9	5	1	1	1	0	0	3	2	2	3	0	52
EXTREMADURA	47	44	32	43	40	57	58	48	64	66	62	46	45	40	43	36	38	8	24	14	37	30	28	950
NAVARRA	35	37	33	33	35	28	38	40	32	32	48	49	46	36	42	45	49	32	34	37	34	33	20	848
PAIS VASCO	183	148	157	154	178	200	207	197	176	162	142	155	151	157	133	169	147	105	119	126	134	125	95	3.520
LA RIOJA	39	29	32	28	26	20	22	28	19	15	26	13	21	21	18	28	21	16	16	24	16	21	12	511
ASTURIAS	96	115	88	82	86	122	102	108	87	78	61	73	69	66	82	71	66	49	49	59	52	66	65	1.792
GALICIA		211	211	212	215	213	220	174	188	225	190	185	162	131	123	119	153	105	129	109	117	137	123	3.652
MADRID					1.131	1.376	1.349	1.359	1.244	1.165	1.044	1.187	1.031	1.135	1.080	975	941	696	657	687	741	747	711	19.256
ARAGON						101	108	119	97	105	103	102	101	118	114	112	131	95	101	91	86	107	86	1.877
MELILLA						3	2	1	4	5	6	0	4	3	2	2	2	1	1	4	5	5	4	54
CASTILLA LA MANCHA						108	106	121	94	93	107	92	110	88	97	88	64	49	55	47	84	64	57	1.524
CASTILLA Y LEON							168	144	171	145	134	119	101	99	101	123	100	92	116	105	91	91	107	2.007
CANTABRIA							53	58	46	39	47	35	65	41	40	31	16	14	10	37	31	40	29	632
MURCIA							117	133	123	107	95	111	121	107	133	130	146	88	108	102	116	109	85	1.931
COM.VALENCIANA										433	350	350	348	472	476	431	504	364	472	523	448	528	446	6.145
ANDALUCIA											642	754	763	694	648	625	573	499	501	555	518	527	552	7.851
TOTAL	**1.526**	**1.773**	**1.722**	**1.832**	**2.990**	**3.621**	**3.814**	**3.912**	**3.662**	**4.065**	**4.469**	**4.570**	**4.340**	**4.426**	**4.352**	**4.122**	**3.991**	**3.021**	**3.198**	**3.335**	**3.395**	**3.512**	**3.239**	**78.887**
Tasa por 100.000 hab.	**10,55**	**10,17**	**9,72**	**10,19**	**12,24**	**12,80**	**11,51**	**11,76**	**10,97**	**10,59**	**9,59**	**9,84**	**9,35**	**9,53**	**9,35**	**8,82**	**8,47**	**6,38**	**6,76**	**7,03**	**7,06**	**7,22**	**6,59**	

Tabla 2: Nuevos diagnósticos de infección por el VIH. Número de casos, porcentaje y tasas por sexo, edad y modo de transmisión. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación

Variable		N	Porcentaje (%)	Tasa/100.000 habitantes
Sexo	Hombre	2.679	82,7	11,1 *
	Mujer	560	17,3	2,2 ¥
Grupo de edad	<15 años	9	0,3	0,1
	15-19 años	50	1,5	1,9
	20-24 años	313	9,7	11,6
	25-29 años	518	16,0	19,2
	30-34 años	580	17,9	20,2
	35-39 años	487	15,0	15,9
	40-44 años	383	11,8	10,8
	45-49 años	305	9,4	7,5
	50 o más años	594	18,3	2,8
Modo de transmisión	HSH	1.519	46,9	6,3*
	Heterosexual	902	27,8	1,8 §
	- Hombre	508	15,7	2,1*
	- Mujer	394	12,2	1,6¥
	PID	49	1,5	0,1§
	Materno-Infantil**	5	0,2	0,01§
	Hemoderivados/Transfusión***	6	0,2	0,01§
	Otros	36	1,1	0,1§
	NC	722	22,3	1,5§
Total		3.239	100	6,59

HSH=Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres; PID=Personas que se inyectan drogas; Otros=Otro mecanismo de transmisión; NC=No consta información.

* Tasa por 100.000 hombres; ¥ Tasa por 100.000 mujeres; § Tasa por 100.000 habitantes

** Un caso nacido fuera de España.

*** Todos los casos con este modo de transmisión fueron transfundidos fuera de España.

Tabla 3: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por CCAA de notificación y modo de transmisión. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación

CCAA de notificación	Modo de transmisión														Total	
	HSH		Heterosexual		PID		Materno-infantil		Hemoderivados/ transfusión		Otros		NC			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
ANDALUCÍA	230	41,7	138	25,0	18	3,3	0	0,0	1	0,2	11	2,0	154	27,9	552	100
ARAGÓN	25	29,1	32	37,2	2	2,3	1	1,2	1	1,2	0	0,0	25	29,1	86	100
ASTURIAS	34	52,3	28	43,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	4,6	65	100
BALEARES	80	44,7	82	45,8	9	5,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	4,5	179	100
CANARIAS	57	28,1	73	36,0	3	1,5	0	0,0	0	0,0	5	2,5	65	32,0	203	100
CANTABRIA	0	0,0	0	0,0	2	6,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	27	93,1	29	100
CASTILLA LA MANCHA	21	36,8	11	19,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	5,3	22	38,6	57	100
CASTILLA Y LEÓN	59	55,1	40	37,4	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	8	7,5	107	100
CATALUÑA	171	39,1	130	29,7	7	1,6	2	0,5	0	0,0	5	1,1	122	27,9	437	100
COM. VALENCIANA	234	52,5	100	22,4	2	0,4	1	0,2	1	0,2	5	1,1	103	23,1	446	100
EXTREMADURA	7	25,0	2	7,1	0	0,0	1	3,6	0	0,0	0	0,0	18	64,3	28	100
GALICIA	46	37,4	49	39,8	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	28	22,8	123	100
MADRID	444	62,4	119	16,7	5	0,7	0	0,0	3	0,4	6	0,8	134	18,8	711	100
MURCIA	49	57,6	32	37,6	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	4,7	85	100
NAVARRA	11	55,0	9	45,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	20	100
PAÍS VASCO	42	44,2	52	54,7	1	1,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	95	100
LA RIOJA	6	50,0	5	41,7	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	8,3	0	0,0	12	100
CEUTA	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	100
MELILLA	3	75,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	25,0	4	100
Total	1.519	46,9	902	27,8	49	1,5	5	0,2	6	0,2	36	1,1	722	22,3	3.239	100

HSH=Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres; PID= Personas que se inyectan drogas; Otros=Otro modo de transmisión; NC= No consta información.

Tabla 4: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por sexo y zona geográfica de origen. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación

Sexo	Zona geográfica de origen																	
	España		Europa Occidental		Europa Central-Este		Latinoamérica		África Subsahariana		África del Norte		Otros		NC		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
Hombre	1.138	42,5	65	2,4	80	3,0	985	36,8	120	4,5	89	3,3	41	1,5	161	6,0	2.679	100
Mujer	166	29,6	12	2,1	31	5,5	182	32,5	112	20,0	22	3,9	10	1,8	25	4,5	560	100
Total	1.304	40,3	77	2,4	111	3,4	1.167	36,0	232	7,2	111	3,4	51	1,6	186	5,7	3.239	100

NC=No consta información.

Tabla 5: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por zona geográfica de origen y modo de transmisión. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación

Zona geográfica de origen	Modo de transmisión															
	HSH		Heterosexual		PID		Materno-infantil		Hemoderivados/ transfusión		Otros		NC		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
España	630	48,3	346	26,5	19	1,5	4	0,3	0	0,0	15	1,2	290	22,2	1.304	100
Europa Occidental	44	57,1	13	16,9	0	0,0	0	0,0	0	0,0	2	2,6	18	23,4	77	100
Europa Central-Este	32	28,8	33	29,7	5	4,5	0	0,0	0	0,0	1	0,9	40	36,0	111	100
Latinoamérica	699	59,9	255	21,9	14	1,2	0	0,0	4	0,3	10	0,9	185	15,9	1.167	100
África Subsahariana	12	5,2	129	55,6	1	0,4	1	0,4	2	0,9	5	2,2	82	35,3	232	100
África del Norte	21	18,9	54	48,6	2	1,8	0	0,0	0	0,0	2	1,8	32	28,8	111	100
Otros	18	35,3	22	43,1	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	11	21,6	51	100
NC	63	33,9	50	26,9	8	4,3	0	0,0	0	0,0	1	0,5	64	34,4	186	100
Total	1.519	46,9	902	27,8	49	1,5	5	0,2	6	0,2	36	1,1	722	22,3	3.239	100

HSH=Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres; PID=Personas que se inyectan drogas; Otros=Otro modo de transmisión; NC=No consta información.

Tabla 6: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por modo de transmisión y zona geográfica de origen. España. Año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación

Modo de transmisión	Zona geográfica de origen																Total	
	España		Europa Occidental		Europa Central-Este		Latinoamérica		África Subsahariana		África del Norte		Otros		NC			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
HSH	630	41,5	44	2,9	32	2,1	699	46,0	12	0,8	21	1,4	18	1,2	63	4,1	1.519	100
Heterosexual	346	38,4	13	1,4	33	3,7	255	28,3	129	14,3	54	6,0	22	2,4	50	5,5	902	100
PID	19	38,8	0	0,0	5	10,2	14	28,6	1	2,0	2	4,1	0	0,0	8	16,3	49	100
Materno-infantil	4	80,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	20,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	5	100
Hemoder/transfusión	0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	66,7	2	33,3	0	0,0	0	0,0	0	0,0	6	100
Otros	15	41,7	2	5,6	1	2,8	10	27,8	5	13,9	2	5,6	0	0,0	1	2,8	36	100
NC	290	40,2	18	2,5	40	5,5	185	25,6	82	11,4	32	4,4	11	1,5	64	8,9	722	100
Total	1.304	40,3	77	2,4	111	3,4	1.167	36,0	232	7,2	111	3,4	51	1,6	186	5,7	3.239	100

HSH=Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres; PID=Personas que se inyectan drogas; Otros=Otro modo de transmisión; NC=No consta información.

Tabla 7: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año de diagnóstico y sexo. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Año de diagnóstico	Sexo				Total	
	Hombre		Mujer			
	N	%	N	%	N	%
2013	3.811	85,3	658	14,7	4.469	100
2014	3.896	85,3	674	14,7	4.570	100
2015	3.717	85,6	623	14,4	4.340	100
2016	3.749	84,7	677	15,3	4.426	100
2017	3.706	85,2	646	14,8	4.352	100
2018	3.537	85,8	585	14,2	4.122	100
2019	3.456	86,6	534	13,4	3.991	100
2020	2.602	86,1	419	13,9	3.021	100
2021	2.731	85,4	467	14,6	3.198	100
2022	2.857	85,7	478	14,3	3.335	100
2023	2.918	85,9	477	14,1	3.395	100
2024	2.986	85,0	526	15,0	3.512	100
2025	2.679	82,7	560	17,3	3.239	100
Total	42.645	85,3	7.324	14,7	49.970	100

En el total se ha incluido 1 caso con la variable sexo desconocida.

Tabla 8: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año de diagnóstico y grupo de edad. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Año de diagnóstico	Grupo de edad (años)															
	<15		15-19		20-24		25-29		30-39		40-49		50 o mas		Total	
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
2013	19	0,4	72	1,6	416	9,3	712	15,9	1.643	36,8	1017	22,8	590	13,2	4.469	100
2014	8	0,2	81	1,8	484	10,6	798	17,5	1.537	33,6	1.088	23,8	574	12,6	4.570	100
2015	4	0,1	92	2,1	417	9,6	721	16,6	1.480	34,1	1.023	23,6	603	13,9	4.340	100
2016	13	0,3	88	2,0	437	9,9	703	15,9	1.477	33,4	1.027	23,2	680	15,4	4.426	100
2017	6	0,1	81	1,9	464	10,7	780	17,9	1.462	33,6	939	21,6	620	14,2	4.352	100
2018	8	0,2	77	1,9	435	10,6	741	18,0	1.347	32,7	886	21,5	628	15,2	4.122	100
2019	9	0,2	73	1,8	417	10,4	719	18,0	1.303	32,6	877	22,0	593	14,9	3.991	100
2020	1	0,0	46	1,5	293	9,7	538	17,8	973	32,2	654	21,6	516	17,1	3.021	100
2021	11	0,3	52	1,6	299	9,3	578	18,1	998	31,2	699	21,9	561	17,5	3.198	100
2022	6	0,2	40	1,2	327	9,8	546	16,4	1051	31,5	775	23,2	590	17,7	3.335	100
2023	5	0,1	46	1,4	339	10,0	544	16,0	1101	32,4	736	21,7	624	18,4	3.395	100
2024	7	0,2	66	1,9	294	8,4	622	17,7	1153	32,8	743	21,2	627	17,9	3.512	100
2025	9	0,3	50	1,5	313	9,7	518	16,0	1067	32,9	688	21,2	594	18,3	3.239	100
Total	106	0,2	864	1,7	4.935	9,9	8.520	17,1	16.592	33,2	11.152	22,3	7.800	15,6	49.970	100

En el total se ha incluido 1 caso con edad desconocida.

Tabla 9: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año de diagnóstico y modo de transmisión. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Año de diagnóstico	Modo de transmisión														Total	
	HSH		Heterosexual		PID		Materno-infantil		Hemoderivados /Transfusión		Otros		NC			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
2013	2.380	53,3	1.212	27,1	189	4,2	17	0,4	1	0,0	18	0,4	652	14,6	4.469	100
2014	2.617	57,3	1.153	25,2	159	3,5	4	0,1	0	0,0	13	0,3	624	13,7	4.570	100
2015	2.473	57,0	1.073	24,7	127	2,9	3	0,1	3	0,1	21	0,5	640	14,7	4.340	100
2016	2.537	57,3	1.116	25,2	140	3,2	12	0,3	7	0,2	27	0,6	587	13,3	4.426	100
2017	2.537	58,3	1.156	26,6	124	2,8	4	0,1	6	0,1	15	0,3	510	11,7	4.352	100
2018	2.434	59,0	1.074	26,1	126	3,1	8	0,2	2	0,0	25	0,6	453	11,0	4.122	100
2019	2.416	60,5	1.116	28,0	98	2,5	8	0,2	1	0,0	17	0,4	335	8,4	3.991	100
2020	1.727	57,2	727	24,1	64	2,1	0	0,0	3	0,1	23	0,8	477	15,8	3.021	100
2021	1.753	54,8	839	26,2	56	1,8	5	0,2	1	0,0	15	0,5	529	16,5	3.198	100
2022	1.823	54,7	839	25,2	62	1,9	4	0,1	2	0,1	51	1,5	554	16,6	3.335	100
2023	1.893	55,8	908	26,7	63	1,9	5	0,1	5	0,1	14	0,4	507	14,9	3.395	100
2024	1.902	54,2	1016	28,9	55	1,6	6	0,2	6	0,2	18	0,5	509	14,5	3.512	100
2025	1.519	46,9	902	27,8	49	1,5	5	0,2	6	0,2	36	1,1	722	22,3	3.239	100
Total	28.011	56,1	13.131	26,3	1.312	2,6	81	0,2	43	0,1	293	0,6	7.099	14,2	49.970	100

HSH=Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres; PID=Personas que se inyectan drogas; Otros=Otros modos de transmisión; NC= No consta información.

Tabla 10: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año de diagnóstico, modo de transmisión y sexo. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Año de diagnóstico	Modo de transmisión																								Total	
	HSH		Heterosexual				PID				Materno-infantil				Hemoderivados /Transfusión				Otros				NC					
	Hombre		Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Hombre		Mujer		Hombre		Mujer			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
2013	2.380	53,3	682	15,3	530	11,9	152	3,4	37	0,8	12	0,3	5	0,1	1	0,0	0	0,0	15	0,3	3	0,1	569	12,7	83	1,9	4.469	100
2014	2.617	57,3	591	12,9	562	12,3	131	2,9	28	0,6	1	0,0	3	0,1	0	0,0	0	0,0	10	0,2	3	0,1	546	11,9	78	1,7	4.570	100
2015	2.473	57,0	573	13,2	500	11,5	91	2,1	36	0,8	2	0,0	1	0,0	1	0,0	2	0,0	17	0,4	4	0,1	560	12,9	80	1,8	4.340	100
2016	2.537	57,3	551	12,4	565	12,8	116	2,6	24	0,5	4	0,1	8	0,2	4	0,1	3	0,1	20	0,5	7	0,2	517	11,7	70	1,6	4.426	100
2017	2.537	58,3	610	14,0	546	12,5	97	2,2	27	0,6	2	0,0	2	0,0	3	0,1	3	0,1	13	0,3	2	0,0	444	10,2	66	1,5	4.352	100
2018	2.434	59,0	576	14,0	498	12,1	105	2,5	21	0,5	2	0,0	6	0,1	1	0,0	1	0,0	21	0,5	4	0,1	398	9,7	55	1,3	4.122	100
2019	2.416	60,5	636	15,9	480	12,0	75	1,9	23	0,6	5	0,1	3	0,1	1	0,0	0	0,0	16	0,4	1	0,0	307	7,7	27	0,7	3.991	100
2020	1.727	57,2	385	12,7	342	11,3	50	1,7	14	0,5	0	0,0	0	0,0	2	0,1	1	0,0	20	0,7	3	0,1	418	13,8	59	2,0	3.021	100
2021	1.753	54,8	458	14,3	381	11,9	47	1,5	9	0,3	4	0,1	1	0,0	1	0,0	0	0,0	13	0,4	2	0,1	455	14,2	74	2,3	3.198	100
2022	1.823	54,7	475	14,2	364	10,9	52	1,6	10	0,3	2	0,1	2	0,1	2	0,1	0	0,0	41	1,2	10	0,3	462	13,9	92	2,8	3.335	100
2023	1.893	55,8	535	15,8	373	11,0	53	1,6	10	0,3	2	0,1	3	0,1	2	0,1	3	0,1	9	0,3	5	0,1	424	12,5	83	2,4	3.395	100
2024	1.902	54,2	616	17,5	400	11,4	48	1,4	7	0,2	3	0,1	3	0,1	2	0,1	4	0,1	14	0,4	4	0,1	401	11,4	108	3,1	3.512	100
2025	1.519	46,9	508	15,7	394	12,2	45	1,4	4	0,1	2	0,1	3	0,1	1	0,0	5	0,2	24	0,7	12	0,4	580	17,9	142	4,4	3.239	100
Total	28.011	56,1	7.196	14,4	5.935	11,9	1.062	2,1	250	0,5	41	0,1	40	0,1	21	0,0	22	0,0	233	0,5	60	0,1	6.081	12,2	1017	2,0	49.970	100

En el total se ha incluido 1 caso con la variable sexo desconocida.
HSH=Hombres que mantienen relaciones sexuales con hombres; PID=Personas que se inyectan drogas; Otros=Otros modos de transmisión; NC= No consta información.

Tabla 11: Distribución de nuevos diagnósticos de infección por el VIH por año y zona geográfica de origen. Período 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Año de diagnóstico	Zona geográfica de origen																Total	
	España		Europa Occidental		Europa Central-Este		Latinoamérica		África Subsahariana		África del Norte		Otros		NC			
	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%	N	%
2013	2.919	65,3	185	4,1	128	2,9	760	17,0	229	5,1	57	1,3	41	0,9	150	3,4	4.469	100
2014	2.979	65,2	153	3,3	152	3,3	796	17,4	242	5,3	66	1,4	57	1,2	125	2,7	4.570	100
2015	2.814	64,8	138	3,2	128	2,9	764	17,6	238	5,5	69	1,6	68	1,6	121	2,8	4.340	100
2016	2.713	61,3	177	4,0	173	3,9	864	19,5	258	5,8	77	1,7	64	1,4	100	2,3	4.426	100
2017	2.519	57,9	158	3,6	154	3,5	999	23,0	289	6,6	86	2,0	61	1,4	86	2,0	4.352	100
2018	2.237	54,3	156	3,8	143	3,5	1.093	26,5	280	6,8	69	1,7	58	1,4	86	2,1	4.122	100
2019	2.127	53,3	106	2,7	129	3,2	1.180	29,6	233	5,8	68	1,7	57	1,4	91	2,3	3.991	100
2020	1.604	53,1	91	3,0	99	3,3	953	31,5	113	3,7	53	1,8	39	1,3	69	2,3	3.021	100
2021	1.755	54,9	85	2,7	98	3,1	908	28,4	139	4,3	76	2,4	55	1,7	82	2,6	3.198	100
2022	1.662	49,8	90	2,7	117	3,5	1.101	33,0	167	5,0	79	2,4	54	1,6	65	1,9	3.335	100
2023	1.611	47,5	99	2,9	101	3,0	1.190	35,1	185	5,4	92	2,7	47	1,4	70	2,1	3.395	100
2024	1.396	39,7	107	3,0	107	3,0	1.255	35,7	191	5,4	106	3,0	51	1,5	299	8,5	3.512	100
2025	1.304	40,3	77	2,4	111	3,4	1.167	36,0	232	7,2	111	3,4	51	1,6	186	5,7	3.239	100
Total	27.640	55,3	1.622	3,2	1.640	3,3	13.030	26,1	2.796	5,6	1.009	2,0	703	1,4	1.530	3,1	49.970	100

NC=No consta información.

FIGURAS

Figura 1. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por edad y sexo. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 1
Nuevos diagnósticos de VIH. Edad y sexo.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso de notificación.



n= 3.239

Figura 2. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 2
Nuevos diagnósticos de VIH. Modo de transmisión
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso de notificación.



n= 3.239

PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; NC: No consta

Figura 3. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión y sexo. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 3
Nuevos diagnósticos de VIH. Modo de transmisión y sexo.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; NC: No consta

Figura 4. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión según grupos de edad. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 4
Nuevos diagnósticos de VIH. Modo de transmisión según grupos de edad.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; NC: No consta

Figura 5. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por zona geográfica de origen. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 5
Nuevos diagnósticos de VIH. Zona geográfica de origen.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



n= 3.239

Figura 6. Nuevos diagnósticos de VIH según zona geográfica de origen por grupos de edad. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 6
Nuevos diagnósticos de VIH según zona geográfica de origen por grupos de edad.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



NC: No consta

Figura 7. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por modo de transmisión según zona geográfica de origen. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 7
Nuevos diagnósticos de VIH
Modo de transmisión según zona geográfica de origen.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres; NC: No consta

Figura 8. Nuevos diagnósticos de VIH. Distribución por zona geográfica de origen según modo de transmisión. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 8
Nuevos diagnósticos de VIH
Zona geográfica de origen según modo de transmisión.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Figura 9. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 9
Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



n= 2.809

Figura 10. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según sexo. España, año 2025.Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 10
Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según sexo.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



Hombres (n= 2.331)



Mujeres (n= 478)

Figura 11. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según grupo de edad. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 11
Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según grupo de edad. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



n= 2.809

Figura 12. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según zona geográfica de origen. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 12
Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según zona geográfica de origen. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



n= 2.809

Figura 13. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío según modo de transmisión en pacientes con diagnóstico tardío. España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 13
Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío.
España, año 2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Figura 14. Nuevos diagnósticos de VIH anuales totales y según sexo. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 14.
Número de nuevos diagnósticos de VIH anuales totales y según sexo. España, 2013-2025.
Datos no corregidos por retraso en la notificación



Figura 15. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales, totales y según sexo. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación.

Figura 15
Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales, totales y según sexo. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación



Figura 16. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales según modo de transmisión. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación.

Figura 16
Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales según modo de transmisión. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

**Tasa por 100.000 hombres

Figura 17. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y sexo. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación.

Figura 17
Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y sexo.
España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación.



**Tasa por 100.000 hombres

PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Figura 18. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH en HSH, por año de diagnóstico y grupos de edad. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en notificación.

Figura 18
Tasas de nuevos diagnósticos de VIH en HSH, por año de diagnóstico y grupos de edad
España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en notificación.



**Tasas por 100.000 hombres

Figura 19. Número y porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH según región de origen. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 19
Número y porcentaje de nuevos diagnósticos de VIH según región de origen. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación



Figura 20. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación.

Figura 20
Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación.



** Tasa por 100.000 hombres

PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Figura 21. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación (Hombres)

Figura 21
Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación

HOMBRES



** Tasa por 100.000 hombres

PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Figura 22. Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación (Mujeres)

Figura 22
Tasas de nuevos diagnósticos de VIH anuales por modo de transmisión y lugar de origen. España, 2013-2025. Datos corregidos por retraso en la notificación.

MUJERES



PID: Personas que se inyectan drogas

Figura 23. Nuevos diagnósticos de VIH. Diagnóstico tardío (<350 CD4) según año de diagnóstico y modo de transmisión, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación

Figura 23
Nuevos diagnósticos de VIH.
Diagnóstico tardío (<350 CD4) según año de diagnóstico y modo de transmisión.
España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Figura 24. Mediana del recuento de CD4 al diagnóstico de VIH por modo de transmisión. España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.

Figura 24
Mediana del recuento de CD4 al diagnóstico de VIH por modo de transmisión.
España, 2013-2025. Datos no corregidos por retraso en la notificación.



PID: Personas que se inyectan drogas; HSH: Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres

Responsables de la vigilancia epidemiológica del VIH y sida en España
CCAA e instituciones participantes

• Andalucía	Esperanza Carmona
• Aragón	Inés Guiu
• Asturias	Mario Margolles Ana Mª Fernández
• Baleares	Magdalena Salom Laura Molina
• Cantabria	Luis Viloria
• Canarias	Oscar Guillermo Pérez
• Castilla La Mancha	Ana Esmeralda Santos
• Castilla León	Henar Marcos
• Cataluña	Evelin López Corbeto
• Ceuta	Irene López
• Comunidad Valenciana	Lourdes Rausell Adrian
• Extremadura	Jesus Gallo Santiago Vicente
• Galicia	Jesús Prego
• Madrid	Carlos Cevallos Ángel Miguel Benito
• Melilla	Daniel Castrillejo
• Murcia	Isabel Barranco Encarna Vicente
• Navarra	Jesús Castilla
• País Vasco	Patricia Sancho
• La Rioja	Ana Carmen Ibañez
• Centro Nacional de Epidemiología	Asunción Díaz Victoria Hernando