



Orden SND/983/2022, de 6 de octubre, por la que se convoca a la realización de pruebas de aptitud a determinados nacionales de Estados miembros de la Unión Europea que han solicitado el reconocimiento de la cualificación profesional para ejercer en España las profesiones sanitarias de Enfermería, Farmacia, Medicina, Fisioterapia, Podología o una especialidad en Ciencias de la Salud.

Madrid, martes 13 de diciembre de 2022.

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS

1. La violencia en la que la víctima se ve humillada y minusvalorada, produciéndose un directo y realizado activamente en forma de insultos y vejaciones o bien llevado a cabo de un modo más pasivo, desvalorizando a la pareja sin que ésta considere que está sufriendo un ataque, se denomina:
 - a) Violencia física.
 - b) Violencia psicológica.
 - c) Violencia económica.
 - d) Violencia sexual.
 - e) Violencia vicaria.
2. La fase de acumulación de tensión del Ciclo de la Violencia de Leonor Walker se corresponde con:
 - a) La fase 1.
 - b) La fase 2.
 - c) La fase 3.
 - d) La fase 4.
 - e) La fase 5.
3. Teniendo en cuenta los principios generales en cuanto al intervalo mínimo entre la administración no simultánea de vacunas, identifique el intervalo mínimo entre una vacuna inactivada y otra atenuada:
 - a) Dos semanas.
 - b) Ninguno.
 - c) Cuatro semanas.
 - d) Ocho semanas.
 - e) Seis semanas
4. ¿Qué acciones se deben recomendar a los padres en caso de sospecha de consumo de drogas o conductas que podrían desembocar en algún otro tipo de adicción de los hijos?:
 - a) No se debe confrontar.
 - b) Hay que dar la importancia justa.
 - c) Hay que dramatizar.
 - d) Hay que encubrir.
 - e) No hay que compartir la preocupación.



5. Atendiendo a las enfermedades que forman parte del programa de cribado neonatal de enfermedades endocrino-metabólicas de la cartera común de servicios asistenciales del Sistema Nacional de Salud (SNS), identifique la opción INCORRECTA:
 - a) Fibrosis quística.
 - b) Acidemia glutárica tipo I (GA-I).
 - c) Deficiencia de acil-coenzima A-deshidrogenasa de cadena media (MCADD).
 - d) Deficiencia de 3-hidroxi-acil-coenzima A-deshidrogenasa de cadena larga (LCHADD).
 - e) Defecto de regeneración de bipterinas.

6. ¿Qué tipo de mascarilla para uso preferente por profesionales no sirve para proteger a los demás?:
 - a) FFP1 sin válvula de exhalación.
 - b) FFP2 sin válvula de exhalación.
 - c) FFP3 sin válvula de exhalación.
 - d) Mascarilla quirúrgica.
 - e) FFP2 con válvula de exhalación.

7. Identifique la consideración INCORRECTA para el uso de la sutura adhesiva:
 - a) No usar en heridas infectadas.
 - b) No usar en heridas con bordes irregulares.
 - c) Usar en heridas de alta tensión.
 - d) No usar en heridas con piel circundante grasa con mucho vello.
 - e) Usar en incisiones quirúrgicas de baja tensión.

8. Identifique cuál de los siguientes hilos de sutura son reabsorbibles:
 - a) Seda.
 - b) Poligluconato.
 - c) Lino.
 - d) Nylon.
 - e) Polietileno.

9. La técnica asertiva que consiste en contestar al receptor con una pregunta que pone en positivo lo que se está discutiendo, dando además al usuario la oportunidad de afrontar en el mismo sentido la crítica o dificultad que nos haya planteado, se denomina:
 - a) Disco rayado.
 - b) Pregunta asertiva.
 - c) Acuerdo asertivo.
 - d) Claudicación simulada.
 - e) Aplazamiento asertivo.



10. El panel de expertos como técnica formativa en educación para la salud se corresponde con:
- Una técnica expositiva.
 - Una técnica de análisis.
 - Una técnica de investigación de aula.
 - Una técnica de desarrollo de habilidades.
 - Una técnica de simulación.
11. Con relación a la tutorización de alumnos de grado en el proceso de aprendizaje, es importante conocer aspectos fundamentales. Identifique la respuesta correcta:
- Se establece una relación binomio autoridad-subordinado.
 - El tutor tiene un papel de juicio y control.
 - El tutor debe centrarse en poner en evidencia las debilidades y errores de alumno con el fin de mejorar.
 - El tutor orienta y acompaña de forma más próxima la evolución del estudiante.
 - El tutor tiene principalmente funciones evaluadoras, el resto de funciones son secundarias.
12. Cuando en un documento de gestión de la calidad nos encontramos con este dato: Población entre 35 y 74 años con algún factor de riesgo cardiovascular en quienes consta calculado el riesgo cardiovascular en los últimos 5 años/ Población entre 35-74 años con algún factor de riesgo y algún registro en el periodo de evaluación. Se trata de:
- Un estándar.
 - Un indicador.
 - Un criterio.
 - Un objetivo.
 - Un proceso
13. Cuando en un documento de gestión de la calidad nos encontramos con este dato: Se hará uso del servicio de traducción simultánea para el 95% de usuarios extranjeros con problemas de idiomas. Se está refiriendo a:
- Un indicador.
 - Un criterio.
 - Un estándar.
 - Un proceso.
 - Un objetivo.



14. ¿Qué tipo de aprendizaje NO se recomienda dentro de la metodología de la Educación para la Salud?:
- Aprendizaje significativo.
 - Aprendizaje constructivista.
 - Aprendizaje basado en el propuesto por David Ausubel.
 - Aprendizaje experiencial.
 - Aprendizaje Blended.
15. Atendiendo al modelo de activos para la salud en Atención Primaria de Salud, indique la respuesta correcta:
- El enfoque de activos se basa en la teoría de déficit desarrollada por Dorothea Orem basada en el modelo factorial denominado “sentido de la coherencia”.
 - Se define activo de salud como cualquier factor o recurso que identifican profesionales sanitarios como potenciadores de la capacidad de individuos, comunidades y poblaciones para mantener la salud y el bienestar.
 - Este modelo sitúa al profesional sanitario como el agente que identifica la capacidad en la población para detectar los factores de riesgo que le rodea.
 - El modelo de activos aporta claves fundamentales para abordar la prevención de la enfermedad.
 - El modelo de activos para la salud supone una revitalización de las intervenciones de promoción de la salud y de salud comunitaria en términos de intersectorialidad, salud positiva, participación, equidad y orientación a los determinantes de la salud.
16. Si tras la realización del MINIMENTAL (MEC-MINIEXAMEN COGNOSCITIVO DE LOBO) a un usuario mayor de 65 años, se obtiene una puntuación de 30, la interpretación sería:
- Deterioro cognitivo leve.
 - Deterioro cognitivo moderado I.
 - Deterioro cognitivo moderado II.
 - Deterioro cognitivo grave.
 - Probablemente sin deterioro cognitivo.
17. Con relación al documento de instrucciones previas, es correcto que:
- Es el documento por el que una persona de más de 14 años manifiesta anticipadamente su voluntad con objeto de que ésta se cumpla en el momento en que llegue a situaciones en cuyas circunstancias no sea capaz de expresarla personalmente sobre los distintos aspectos incluidos en la normativa sobre este tema.
 - Contempla únicamente la voluntad sobre cuidados y el tratamiento de su salud.
 - Se centra básicamente en los deseos sobre el destino, una vez llegado el momento, de su cuerpo o sus órganos.
 - Facilita a los profesionales de la salud la toma de decisiones respetuosas con la voluntad del enfermo cuando este no tiene ya capacidad para decidir por sí mismo.
 - Se llama igual en todas las Comunidades Autónomas.



18. Para valorar el apoyo social percibido, se utiliza:
- Test del Informador.
 - Cuestionario DUKE-UNK.
 - EuroQol-5D.
 - Escala de Deterioro Global de Reisberg.
 - Índice de esfuerzo del cuidador.
19. Atendiendo al documento Consejo integral en estilo de vida en Atención Primaria, vinculado con recursos comunitarios en población adulta ¿qué recomendaciones en cuanto a la alimentación se deben dar? Seleccione la correcta:
- Se recomienda que las grasas no superen el 20% de la ingesta diaria, debiendo reducirse el consumo de grasas saturadas y ácidos grasos trans.
 - Disminuir a menos de un 10% la ingesta calórica procedente de ácidos grasos saturados.
 - Se debe incrementar la ingesta diaria de frutas, verduras y hortalizas hasta alcanzar, al menos, 600 g/día. Esto es, consumir, como mínimo, 4 raciones al día de estos alimentos.
 - Eliminar el consumo de productos ricos en azúcares simples, como golosinas, dulces y refrescos.
 - Reducir el consumo de sal, de toda procedencia, a menos de 2,5 g/día, y promover la utilización de sal yodada.
20. Identifique la respuesta INCORRECTA con relación a las vacunas contra la Covid-19:
- La vacuna Janssen es tipo vector de adenovirus.
 - La vacuna Moderna requiere de dos dosis con un intervalo general entre ellas de 28 días.
 - La vacuna Moderna es de tipo ARN mensajero.
 - La vacuna Pfizer es de tipo ARN mensajero.
 - La vacuna AstraZeneca es tipo ARN mensajero
21. ¿Cada cuánto tiempo debe hacerse el consejo sobre el tabaco en población adulta general no fumadora?:
- No es necesario reinterrogar a las personas mayores de 25 años de las que se tenga constancia en la historia clínica, que nunca han fumado.
 - Una vez al año, coincidiendo con la valoración del resto de los factores.
 - Cada 7-10 meses, coincidiendo con la valoración del resto de los factores.
 - Cada vez que el paciente acuda a consulta por cualquier otro motivo.
 - Al menos cada 3 años, coincidiendo con la valoración del resto de los factores.



22. En relación con la espirometría señale respuesta correcta:
- a) Uno de los principales aspectos a medir es el Volumen Espiratorio Forzado en el primer segundo (FEV1), volumen de aire exhalado durante el primer segundo de la maniobra de espiración no forzada.
 - b) Es preciso acudir en ayunas.
 - c) Es importante no fumar al menos 8 horas antes de la prueba.
 - d) Los valores obtenidos se interpretan comparándolos con los valores teóricos correspondientes teniendo en cuenta sexo, edad, talla, peso y etnia. En caso de que este no lleve incorporada una estación meteorológica propia, deben introducirse manualmente los datos de: temperatura, presión atmosférica y, en algunos espirómetros, humedad relativa del aire.
 - e) Una cirugía de ojo reciente no es una contraindicación para su realización.
23. La depresión tiene un gran impacto negativo sobre el desarrollo personal de los niños, su rendimiento escolar y el establecimiento de relaciones sociales. Ante esta situación es importante conocer los factores de riesgo asociados a la depresión en niños y adolescentes. Seleccione la correcta:
- a) Son factores biológicos de riesgo, los genéticos y la edad entre otros.
 - b) Los factores de protección no reducen la probabilidad de depresión en presencia de factores de vulnerabilidad o de activación.
 - c) Los logros personales valorados socialmente son un factor de riesgo.
 - d) Factores familiares como dificultades en las relaciones con igual y el acoso (bullying) son factores de riesgo asociados a la depresión en niños y adolescentes.
 - e) Factores sociales como los conflictos en las relaciones familiares son factores de riesgo asociados a la depresión en niños y adolescentes.
24. Con relación al Cribado de ambliopía, estrabismo y trastornos de refracción, identifique la opción correcta si en la revisión se observa el reflejo del fondo de ambos ojos simultáneamente a través del oftalmoscopio y da una apreciación cualitativa de la presencia de estrabismo. Si los ojos están centrados y no existe una gran anisometropía (diferencia de dioptrías entre los dos ojos) el reflejo será simétrico en forma y color:
- a) El test de Hirschberg.
 - b) El test de Bruckner.
 - c) El test de Cover.
 - d) Exploración de la agudeza visual mediante optotipos.
25. Atendiendo al modelo de las 5 Aes para las intervenciones de asesoramiento, identifique la correcta:
- a) Aportar.
 - b) Adecuar.
 - c) Acompañar
 - d) Adiestrar.
 - e) Asegurar



26. Con relación al proceso de Enfermería es cierto que:
- La valoración consiste en determinar si se han alcanzado los objetivos y resultados esperados.
 - La planificación consiste en reunir información sobre el estado del paciente.
 - La implementación consiste en poner en práctica las actuaciones profesionales identificadas en la planificación.
 - Evaluar consiste en identificar los problemas del paciente.
 - Diagnosticar, se trata de fijar los objetivos de los cuidados e identificar las actuaciones profesionales más apropiadas.
27. Atendiendo al protocolo Buckman de comunicación de malas noticias, la etapa de preparar el contexto físico más adecuado se corresponde con:
- Primera etapa.
 - Segunda etapa.
 - Tercera etapa.
 - Cuarta etapa.
 - Quinta etapa.
28. En los planes de cuidados, la fase en la que una vez determinado los problemas o situaciones a mejorar, la enfermera establece los objetivos a conseguir se denomina:
- Fase de implementación.
 - Fase de valoración.
 - Fase diagnóstica.
 - Fase de planificación.
 - Fase de evaluación.
29. Identifique cuál de los siguientes es un requisito del autocuidado o concepto incluido en la teoría de Dorotea Orem:
- Una de las afirmaciones de la teoría del Autocuidado es no considerar el autocuidado como un comportamiento aprendido.
 - Requisitos autocuidados de desarrollo.
 - En la teoría se describen cuatro fases en la relación entre enfermera y paciente: Orientación, identificación, Aprovechamiento, y resolución.
 - Los factores que condicionan la conducta de autocuidado, Orem los denominó Determinantes sociales para la salud.
 - Requisitos de cuidados parciales
30. En relación con los Patrones funcionales es cierto que:
- Uno de los patrones incluidos es actividad-ejercicio.
 - Fue diseñado por Linda Carpenito.
 - Se centra en 14 patrones funcionales.
 - Una de las necesidades incluidas en el modelo es dormir y descansar.
 - El patrón nutricional - metabólico pretende conocer los patrones de la función excretora de la persona.



31. El modelo de relaciones interpersonales corresponde a:
- Nola J. Pender.
 - Callista Roy
 - Marjory Gordon.
 - Dorotea Orem.
 - Hildegard Peplau.
32. Identifique la correcta en cuanto a la presentación de un diagnóstico de Enfermería:
- Una etiqueta o denominación.
 - Una lista de actividades.
 - Unos indicadores concretos de la situación en la que se encuentra el resultado.
 - Una escala de medida.
33. Teniendo en cuenta la importancia de la atención a las familias, un instrumento utilizado sería el APGAR familiar. Señale la opción INCORRECTA atendiendo al mismo:
- El APGAR familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar.
 - Una puntuación de menos o igual de 9 supone una disfunción severa
 - El APGAR familiar evalúa cinco funciones básicas de la familia, consideradas las más importantes por el autor: Adaptación, Participación, Gradiente de recurso personal, Afecto, y Recursos.
 - Uno de los elementos a evaluar es la satisfacción por la ayuda recibida de la familia cuando se tiene algún problema y/o necesidad.
 - No existe un APGAR familiar específico para niños.
34. Identifique cuál de los siguientes es un elemento paraverbal a tener en cuenta en la comunicación:
- La entonación.
 - La apariencia personal.
 - Los gestos.
 - La mirada.
 - La expresión facial.
35. El tipo de incontinencia en el que se experimenta goteo de orina frecuente o constante debido a que la vejiga no se vacía por completo se denomina:
- Incontinencia urinaria de urgencia.
 - Incontinencia urinaria mixta.
 - Incontinencia urinaria continúa.
 - Incontinencia por rebosamiento.
 - Incontinencia urinaria funcional.



36. Identifique la opción correcta en cuanto a los Acontecimientos Vitales a tener en cuenta en la escala de Acontecimientos Vitales Estresantes Holmes y Rahe, 1976:
- Ser cuidador principal.
 - Preparación pruebas de Oferta Pública de Empleo.
 - Jubilación.
 - Excarcelación de un miembro de la familia.
 - Desastres naturales.
37. En el paro cardíaco, son incorrectas todas las respuestas, menos una de ella, identifíquela:
- Si es pertinente realizar la maniobra de RCP tras comprobar el ritmo y no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, se considerará una relación de compresión-ventilación siendo esta de 30:2 en adultos.
 - Si es pertinente realizar la maniobra de RCP tras comprobar el ritmo y no hay un dispositivo de manejo avanzado de la vía aérea, se considerará una relación de compresión-ventilación siendo esta de 10:2 en niños.
 - La hipotermia es una causa irreversible.
 - La trombosis pulmonar es una causa irreversible.
 - La adrenalina se administrará cuando sea pertinente cada 8-10 minutos.
38. Con relación a la Escala de coma de Glasgow, es INCORRECTO que:
- Se valora la apertura de ojos.
 - Se valora la respuesta verbal.
 - Se valora la respuesta motora.
 - Se valoran el grado de estrés.
 - Se especifica los lugares para la estimulación física.
39. Identifique cuál de las siguientes zonas estaría indicada para la inserción de un catéter subcutáneo:
- Zonas de pliegue cutáneo.
 - Región infraclavicular.
 - Prominencias óseas.
 - Zona periumbilical.
 - Regiones axilar y mamaria.
40. Atendiendo al cuestionario AUDIT para la detección del consumo de alcohol, se considera consumo de riesgo alto de alcohol en el hombre si la puntuación obtenida es:
- De 0 a 7.
 - De 8 a 15.
 - De 16 a 19.
 - De 20 a 25.
 - De más de 30.



41. La pirámide de Maslow consta de cinco niveles ordenados jerárquicamente acerca de la motivación y las necesidades del ser humano. Identifique cual estaría en el segundo nivel empezando por la base:
- Afiliación.
 - Necesidades fisiológicas.
 - Reconocimiento.
 - Seguridad.
 - Autorrealización.
42. El tipo de prevención que va dirigida a evitar la aparición de una enfermedad o problema de salud, mediante el control de los agentes causales o los factores de riesgo, se denomina:
- Primaria.
 - Secundaria.
 - Terciaria.
 - Cuaternaria.
 - Medidas correctoras.
43. ¿Cuál de las siguientes se considera una actividad de prevención primaria?:
- Vacunación.
 - Campañas para la detección precoz del cáncer de mama.
 - Fisioterapia respiratoria en pacientes post- Infarto Agudo de miocardio.
 - Realización de fisioterapia después de retirar un yeso por fractura.
 - Campañas para la detección precoz del cáncer de colon.
44. El grupo sanguíneo es una variable:
- Cuantitativa dicotómica.
 - Cualitativa nominal.
 - Cuantitativa continua.
 - Cuantitativa discreta.
 - Cualitativa ordinal.
45. Con relación a la formulación de los objetivos de investigación, señale la opción CORRECTA:
- El objetivo general debe ser concreto, medible y alcanzable, no siendo así en el caso de los objetivos específicos.
 - Se inician con un sujeto.
 - El verbo utilizado se presenta en participio.
 - El contexto del estudio donde se realizará el proyecto no se especifica dentro de la formulación de los objetivos.
 - Debe indicar los sujetos de estudio.



46. Cuando se remite el resumen de un trabajo a un congreso científico para su valoración con la intención de presentarlo en formato poster si es aceptado, es importante tener en cuenta determinados aspectos, indique la recuesta INCORRECTA:
- Se debe tener en cuenta que la persona que expondrá el poster en el caso de que el trabajo sea admitido tiene que figurar como autor.
 - Se puede remitir el resumen con la estructura de contenido que consideren los autores.
 - El resumen se debe ajustar a la extensión y caracteres límites marcados por la organización.
 - Se deben incluir como tope el número máximo de autores que indique la organización.
 - Se debe respetar la fecha límite marcada por la organización para remitir el resumen.
47. Una representación gráfica de variables cuantitativas sería:
- Diagrama de sectores.
 - Diagrama de barras.
 - Pictograma.
 - Diagrama de quesitos.
 - Diagrama de tallo y hojas.
48. La fase empírica e interpretativa del proceso de la investigación NO incluye:
- Las conclusiones.
 - Los resultados.
 - La discusión.
 - La clasificación de las variables.
 - Gráficas expositivas de los resultados principales.
49. Según la actual cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, con relación al cribado poblacional de cáncer de mama y colorrectal, con carácter general, se realizará con uno de los siguientes criterios:
- En el caso del cribado poblacional de cáncer de mama, se realiza a mujeres de edades comprendidas entre 45 y 69 años.
 - El intervalo de exploración establecido en el cribado de cáncer de mama es cada 2 años.
 - En el caso del cribado poblacional de cáncer colorrectal, se realiza a hombres y mujeres de edades comprendidas entre 45 y 69 años.
 - El intervalo de exploración establecido en el cribado de cáncer de colon es cada 3 años.
 - La prueba de cribado colorrectal es la colonoscopia.



50. Con relación al Test de Fagerström es INCORRECTO que:
- Se trata de una escala de 10 ítems.
 - Puntuación entre 5 y 6 es una dependencia moderada.
 - Puntuación ≤ 4 es una dependencia baja.
 - La puntuación oscila entre 0 y 10.
 - Valora la dependencia de las personas a la nicotina.
51. Identifique cuál de las siguientes es una recomendación basada en la evidencia:
- Se recomienda realizar masajes sobre prominencias óseas para la prevención de las úlceras por presión.
 - No se recomienda a los padres la povidona yodada como antiséptico de primera elección para los cuidados del cordón del recién nacido.
 - Se recomienda el uso de flotadores para la prevención de las úlceras por presión.
 - No se recomienda la inclusión en programas de rehabilitación basada en el ejercicio, para evitar reingresos y mejorar la calidad de vida a los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica.
 - Se recomienda utilizar percusión, clapping, vibración o drenaje postural para favorecer la eliminación de secreciones respiratorias.
52. En relación con la vacuna Tétanos Difteria en adultos señale la respuesta correcta:
- En adultos vacunados en la infancia y adolescencia correctamente según calendario vigente, se recomienda la administración de una dosis de recuerdo en torno a los 65 años y otra a partir de los 80 años.
 - Si tiene criterios para iniciar la primovacuna, se le administrarán 3 dosis siguiendo la pauta de vacunación.
 - Si tiene primovacuna incompleta, se debe reiniciar la pauta de vacunación.
 - En el caso de herida potencialmente tetanígena de un usuario con antecedentes de vacunación con 5 dosis y la última dosis administrada hace 6 años, se administrará una vacuna.
 - En una herida limpia y antecedentes de vacunación de menos de 3 dosis o desconocida, estaría indicada completar la primovacuna.
53. En relación con el modelo transteórico de las etapas de cambio de Prochaska y Diclemente, es FALSO que:
- En la fase de contemplativa se es consciente de la existencia de un problema y se piensa en abordarlo, pero aún no se ha realizado ningún compromiso para actuar.
 - El modelo sugiere que los individuos se mueven a lo largo de cinco etapas.
 - El modelo transteórico sugiere que los individuos se mueven a lo largo de distintas etapas, y que el cambio de conducta es un proceso.
 - Este modelo sostiene que el cambio de conducta en salud responde a un proceso en el que cada persona pasa por varias fases a lo largo del tiempo.
 - En la fase de mantenimiento se trabaja para mantener la conducta en un periodo largo de tiempo (más de 12 meses).



54. Con relación a la higiene de manos y los momentos para la misma, seleccione la respuesta INCORRECTA:
- a) Es necesario lavado de manos antes del contacto directo con el paciente.
 - b) Es necesario lavado de manos antes de realizar una tarea limpia.
 - c) Es necesario lavado de manos antes de realizar una tarea aséptica.
 - d) Se compone de 8 momentos.
 - e) Es necesario lavado de manos después del contacto con el entorno del paciente.
55. Aunque la principal causa de las úlceras por presión es la presión, existen una serie de elementos que, en su presencia, pueden desencadenar o acentuar la susceptibilidad de desarrollarlas. Identifique cuál de los siguientes se trata de un factor intrínseco:
- a) Enfermedades concomitantes: alteraciones respiratorias, cardíacas.
 - b) Humedad por incontinencia y sudoración profusa.
 - c) Pliegues y objetos extraños en la ropa.
 - d) Tratamientos farmacológicos: inmunosupresores, sedantes, vasoconstrictores.
 - e) Humedad ambiental.
56. Identifique cuál de los siguientes NO es un tipo de sutura discontinua:
- Punto simple (percutáneo).
- a) Punto simple con el nudo invertido.
 - b) Sutura intradérmica continúa.
 - c) Punto de colchonero o en U.
 - d) Punto de colchonero vertical.
57. Cuando se habla de un error médico que no produjo un evento adverso porque se detectó a tiempo, se refiere a:
- a) Evento adverso grado 1.
 - b) Evento adverso grado 2.
 - c) Evento centinela.
 - d) Cuasifalla.
 - e) Seguridad del paciente.



58. Con relación al crecimiento físico y desarrollo puberal, identifique la respuesta correcta:
- a) El estadio 2 (M2) de Tanner de desarrollo puberal en la mujer se corresponde con elevación de mama y areola en un mismo plano.
 - b) Se mide el perímetro craneal hasta los 3 años.
 - c) En población inmigrante, se recomienda utilizar tablas de la OMS hasta los 10 años y tablas españolas de Orbegozo corregidas por la talla familiar de los padres en mayores de 10 años.
 - d) A partir de los 3 años, se mide con el niño de pie y descalzo; los talones, nalgas y hombros en el mismo plano vertical, en contacto con el tallímetro, que debe ser un plano ancho; los tobillos deben estar juntos y las plantas de los pies en un plano duro horizontal.
 - e) En niños con síndrome de Down y de Turner se emplearán tablas de crecimiento específicas, y en los recién nacidos pretérmino la edad corregida hasta los 2 años.
59. En la exploración del recién nacido se encuentran los reflejos arcaicos, concretamente en uno de ellos, al introducir un objeto en la palma de la mano, flexiona y agarra. Este reflejo se denomina:
- a) Reflejo de Galant.
 - b) Reflejo de los puntos cardinales.
 - c) Reflejo del Moro.
 - d) Reflejo de extensión cruzada.
 - e) Reflejo de presión palmar.
60. Con relación al crecimiento físico y desarrollo puberal, identifique la respuesta correcta:
- a) El estadio 2 (M2) de Tanner de desarrollo puberal en la mujer se corresponde con elevación de mama y areola en un mismo plano.
 - b) Se mide el perímetro craneal hasta los 3 años.
 - c) En población inmigrante, se recomienda utilizar tablas de la OMS hasta los 10 años y tablas españolas de Orbegozo corregidas por la talla familiar de los padres en mayores de 10 años.
 - d) A partir de los 3 años, se mide con el niño de pie y descalzo; los talones, nalgas y hombros en el mismo plano vertical, en contacto con el tallímetro, que debe ser un plano ancho; los tobillos deben estar juntos y las plantas de los pies en un plano duro horizontal.
 - e) En niños con síndrome de Down y de Turner se emplearán tablas de crecimiento específicas, y en los recién nacidos pretérmino la edad corregida hasta los 2 años.



61. Con relación al proceso asistencial de extracción de tapones de cerumen en adultos. Seleccione la opción correcta:
- a) Tras la extracción, no es posible que el usuario pueda notar una ligera y puntual pérdida de oído, debido a la pequeña cantidad de agua que queda en el oído tras su limpieza.
 - b) El usuario se colocará sentado.
 - c) Se debe de dirigir el cono de la jeringuilla con agua tibia hacia la pared inferior del conducto auditivo externo.
 - d) Se traccionará el pabellón auricular hacia abajo y atrás.
 - e) No hay un número máximo de irrigaciones durante el proceso.
62. Con relación a intervenciones y consejos de cuidados en la infancia a tener en cuenta en consulta, seleccione la opción INCORRECTA:
- a) No usar fotoprotectores en menores de 6 meses.
 - b) Tener en cuenta el almacenamiento seguro de fármacos y sustancias tóxicas.
 - c) Aconsejar el uso de andadores.
 - d) Facilitar direcciones e internet adecuadas para reforzar a los padres la información facilitada en la consulta que resulte de interés.
 - e) Es importante que se utilicen pastas de dientes con los contenidos óptimos de flúor adecuados a la edad. Entre los 6 meses y los 2 años deben usarse pastas con 250 ppm de Flúor; entre los 3 y los 6 años, pastas con 500 ppm de Flúor y a partir de los 6 años pastas con 1000-1450 ppm de Flúor.
63. El cambio de residencia es:
- a) Un determinante incluido en el modelo de Lalonde.
 - b) Un acontecimiento incluido en la escala de acontecimientos vitales estresantes.
 - c) Un elemento a incluir en el genograma.
 - d) Un aspecto a valorar incluido en el documento Consejo integral en estilo de vida en Atención Primaria, vinculado con recursos comunitarios en población adulta.
 - e) Un aspecto estructural del APGAR familiar.



64. En la actuación ante un atragantamiento en un bebé o niño pequeño consciente, sería correcto:
- a) Inicialmente no estaría indicado ponerlo en posición incorporada y animar a toser.
 - b) Ante tos inefectiva en mayores de 1 año, sujetar al niño en una posición inclinada hacia delante y darle 5 golpes en la espalda, entre las escápulas, si es inefectivo iniciar la maniobra de Heimlich (5 compresiones abdominales).
 - c) Dedicar no más de 20 segundos en determinar si respira.
 - d) Ante tos inefectiva en menores de 1 año, colocar al lactante sobre su antebrazo del adulto "boca abajo" y dar 10 golpes secos en la espalda, después, dejándolo "boca arriba" pero con la cabeza más baja que el tronco para favorecer la expulsión del objeto, si no ha expulsado el objeto tras valorarlo, 10 golpes secos en el esternón y probar de nuevo la expulsión del objeto. Si no se ha expulsado el objeto, debe repetir toda la maniobra.
 - e) Intentar extraer el cuerpo extraño con los dedos, "a ciegas".
65. La vivienda como determinante social de la salud incluido en el Marco conceptual de los determinantes de las desigualdades sociales en salud propuesto por Comisión para Reducir las Desigualdades en Salud en España, es:
- a) Un eje de la desigualdad.
 - b) Un factor conductual.
 - c) Un determinante estructural.
 - d) Un factor psicosocial.
 - e) Un recurso material.
66. La escala Edmonton Symptom Assessment System (ESAS) utilizada en cuidados paliativos, valora los siguientes síntomas EXCEPTO:
- a) Dolor.
 - b) Reflejos.
 - c) Cansancio.
 - d) Apetito.
 - e) Somnolencia.
67. La aplicación de toda medida encaminada a mejorar la calidad de vida de los enfermos a quienes se pronostica la muerte a corto plazo se denomina:
- a) Distanasia.
 - b) Eutanasia.
 - c) Ortotanasia.
 - d) Sedación paliativa.
 - e) Cuidados en la agonía.



68. En relación con el desempleo, es FALSO que:
- Se contempla en el marco de determinantes sociales de la salud de Dalghren y Whitehead (1991).
 - Es un determinante social que se relaciona con la salud de las personas.
 - Tasas de desempleo más elevadas causan muertes prematuras.
 - Un trabajo seguro incrementa la salud, el bienestar y la satisfacción laboral.
 - Como el resto de determinantes sociales, se trata de situaciones irreversibles.
69. El tipo de intervención en promoción y educación para la salud a nivel de la comunidad local que busca el desarrollo comunitario, modificación de normas sociales y el trabajo cooperativo en redes, alianzas y plataformas con asociaciones y grupos de distintos tipos, hace alusión a:
- Consejo y asesoramiento.
 - Acción y dinamización social.
 - Educación para la salud grupal y/o colectiva.
 - Información y comunicación.
 - Educación para la salud individual.
70. Cuando los recursos son asignados según las necesidades de cada persona, estamos hablando de:
- Igualdad.
 - Atención inversa.
 - Tercer mundo.
 - Cuarto mundo.
 - Equidad.
71. El Ministerio de Sanidad lanzó la web sobre estilos de vida saludable como una de las acciones de la Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud. Identifique la opción correcta en relación a una de las principales áreas de trabajo que aborda por su evidencia en la repercusión de la salud de las personas:
- Prevención abuso de tecnología y redes sociales.
 - Prevención de enfermedades de transmisión sexual.
 - Alimentación saludable.
 - Violencia de género.
 - Seguridad y lesiones intencionales.
72. A la hora de planificar sesiones formativas de educación para la salud en Atención Primaria, se tienen que tener en cuenta determinados aspectos, en el caso de que se abordaran las transiciones vitales como área de intervención, un ejemplo sería:
- Discapacidades.
 - Enfermedades crónicas.
 - Cuidado de personas dependientes.
 - Sexualidad.
 - Tabaco.



73. Cuando se habla de una enfermedad desconocida o de nueva aparición hasta el momento, generalmente de tipo infeccioso o transmisible se refiere a:
- a) Pandemia.
 - b) Endemia.
 - c) Epidemia reemergente.
 - d) Enfermedad emergente.
 - e) Infodemia.
74. Con relación a la prevalencia es correcto que:
- a) Para su cálculo se necesita el seguimiento de los individuos.
 - b) Su valor no depende de la duración de la enfermedad.
 - c) En el numerador deben estar sólo los casos nuevos.
 - d) Valora y cuantifica enfermedades agudas.
 - e) Es una medida utilizada para valorar la carga y el coste de una enfermedad crónica.
75. En gestión de la calidad, uno de los métodos utilizados en la fase de priorización sería:
- a) Metodología del Flujograma.
 - b) Método DAFO-CAME.
 - c) Método diagrama de Ishikawa.
 - d) Método diagrama causa-efecto.
 - e) Método DARE.
76. Identifique cuál de las siguientes opciones es una dimensión de la calidad:
- a) Costosa.
 - b) Calidad científico-técnica.
 - c) Trabajosa.
 - d) Agrega burocracia.
 - e) Estática.



77. Atendiendo al Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el procedimiento para su actualización es correcto que:
- Su contenido se centra en establecer exclusivamente las prestaciones sanitarias de atención primaria y salud pública.
 - No se incluyen en la cartera de servicios comunes aquellas técnicas, tecnologías o procedimientos que se encuentren en fase de investigación clínica autorizados para uso compasivo.
 - En ella se recoge el conjunto de técnicas, tecnologías o procedimientos, entendiendo por tales cada uno de los métodos, actividades y recursos basados en el conocimiento y experimentación científica, mediante lo que se hacen efectivas las prestaciones sanitarias.
 - La cartera de servicios tiene la consideración de servicios únicos y exclusivos, no habiendo actuaciones diferentes en los distintos servicios de salud en todo el territorio nacional.
 - Establece los servicios comunes, salvo lo que no se puedan ofrecer, como algunas técnicas, tecnologías o procedimientos que marcará las diferencias en determinados territorios.
78. La consulta realizada por iniciativa del profesional sanitario, se denomina:
- Consulta a demanda.
 - Consulta programada.
 - Consulta urgente.
 - Consulta no demorarle.
 - Consulta con cita previa.
79. Atendido a la siguiente pregunta clínica estructurada en formato "PICO" sobre intervención ¿Se deben recomendar los programas educativos estructurados dirigidos a personas con diabetes mellitus tipo 1 y a sus familiares? Identifique cuál sería el componente clave RESULTADOS/OUTCOMES:
- Pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y sus familiares.
 - Programa estructurado.
 - Cuidados habituales.
 - No existe la metodología PICO.
 - Reducción de enfermedad cardiovascular; prevención/reducción de visitas a urgencias, mejoría en calidad de vida, reducción de la mortalidad, reducción del hábito de fumar.



80. Los apartados más comunes que se incluyen en una comunicación tipo poster de un proyecto de investigación de tipo cuantitativo sin resultados son todos, EXCEPTO:
- Metodología.
 - Objetivos.
 - Gráficas con los principales resultados.
 - Introducción.
 - Título.
81. Cuando nos referimos a la facilidad con la que se puede obtener un servicio de salud teniendo en cuenta factores geográficos, de horario, económicos, culturales, entre otros, nos estamos refiriendo al concepto de:
- Eficiencia.
 - Eficacia.
 - Efectividad.
 - Accesibilidad.
 - Calidad asistencial.
82. Atendiendo a la clasificación de las úlceras por presión según las estructuras afectas de los tejidos del Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas (GNEAUPP), la pérdida total del grosor de la piel con destrucción extensa, necrosis del tejido o lesión en músculo, hueso o estructuras de sostén (tendón, cápsula articular, etc.), se corresponde con el estadio:
- Estadio I.
 - Estadio II.
 - Estadio III.
 - Estadio IV.
 - Estadio V.
83. Atendiendo al calendario común recomendado de vacunación a lo largo de toda la vida de 2022 del consejo interterritorial, identifique la opción correcta en relación a la vacuna Hepatitis B (HB):
- La vacunación de los lactantes frente a la hepatitis B requiere 3 dosis, aunque se admiten 4 cuando existe vacunación neonatal indicada.
 - En la infancia se vacunará a los 2, 4 y 6 meses siempre que se asegure una alta cobertura de cribado prenatal de la embarazada.
 - En la infancia se vacunará con pauta 0, 2, 4 y 6 meses a los hijos/as de madres con AgHBs positivo. Se administrará la primera dosis en las primeras 24 horas de vida junto con la administración de inmunoglobulina anti-HB.
 - En adolescente y jóvenes no vacunadas con anterioridad, hasta los 18 años de edad, se administrarán 3 dosis con pauta 0, 1 y 12 meses.
 - Ante una alta cobertura de cribado prenatal de la embarazada, la administración de esta vacuna coindice a los 4 meses con las siguientes vacunas financiadas en todo el territorio nacional: frente a: Poliomielitis, Difteria-tétanos-tosferina, Haemophilus influenzae b y Enfermedad neumocócica.



84. Teniendo en cuenta la importancia del abordaje de la seguridad y lesiones no intencionales en la consulta del niño sano, identifique la opción correcta entre las siguientes recomendaciones generales con relación a los sistemas de retención infantil:
- Colocar la silla de retención en sentido contrario a la marcha hasta los 9 meses.
 - Si el niño pesa 20 kg le corresponde un sistema de retención grupo 1 según normativa R44/04.
 - Los menores de 12 años que tengan una estatura igual o superior a 140 centímetros pueden utilizar directamente los cinturones de seguridad del propio vehículo, aunque es aconsejable que los menores, hasta los 155 centímetros, sigan utilizando los sistemas de retención infantil homologados a su talla y peso si el cinturón roza el cuello.
 - Explicar que conviven seis sistemas homologados de retención infantil para los viajes según peso o estatura del niño.
 - Los padres deben asegurarse de que la sillita de retención elegida está correctamente homologada, lo que garantiza que cumple con los requisitos exigidos por la normativa europea de seguridad de los niños en los trayectos en coche.
85. Atendiendo a las recomendaciones de vacunación frente a la gripe Temporada 2021-2022 del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, identifique cuál de los siguientes es considerado un grupo de población diana de vacunación antigripal:
- Adolescentes con un índice de masa corporal ≥ 30 .
 - Menores con nacimiento prematuro hasta los 6 años de edad.
 - Adolescentes con implante coclear pero no a espera del mismo.
 - Adolescentes con intolerancia a la lactosa.
 - Adolescentes con fibrosis quística.
86. Identifique la etapa del proceso de cambio de Prochaska y Di Clemente en la que se encuentra una persona que no se plantea el cambio:
- Contemplación.
 - Preparación.
 - Acción.
 - Mantenimiento.
 - Precontemplación.
87. La insulina de tipo ultrarrápida tiene su pico máximo a:
- 1-2h.
 - 2-4h.
 - 4-8h.
 - 4-10h.
 - No tiene pico máximo.




88. En cuanto a la aplicación y medición del índice tobillo-brazo (ITB), identifique la respuesta correcta:
- a) El ITB es el cociente obtenido dividiendo la presión sistólica radial obtenida entre la presión sistólica tibial posterior o pedia obtenida.
 - b) Para su cálculo sería necesario únicamente la medición de las dos extremidades de un mismo lado.
 - c) Obtener como resultado 1,20 se considera dentro de los valores que sugieren un riesgo de claudicación.
 - d) El Doppler es un sistema de ultrasonidos que permite estudiar el flujo arterial o venoso de los diferentes sectores vasculares.
 - e) El uso del gel conductor no es necesario para su realización.
89. Atendiendo a las recomendaciones de la redGDPS, identifique la respuesta INCORRECTA en relación a los criterios diagnósticos de DM 2 y aspectos a tener en cuenta:
- a) Glucemia plasmática en ayunas ≥ 110 mg/dl.
 - b) HbA1c $\geq 6,5$ %.
 - c) Glucemia plasmática a las 2 horas del test de sobrecarga oral a la glucosa ≥ 200 mg/dl.
 - d) Glucemia plasmática ≥ 200 mg/dl en pacientes con síntomas clásicos de hiperglucemia o crisis de hiperglucemia.
 - e) El ayuno se define como la no ingestión de calorías durante un mínimo de 8 horas
90. A la hora de interpretar las reacciones a la prueba de la tuberculina, una induración de 5 milímetros o mayor se considera una reacción positiva en las siguientes circunstancias, SALVO:
- a) No tener factores de riesgo de tuberculosos conocidos.
 - b) Tienen el VIH.
 - c) Tengan un trasplante de órgano.
 - d) Estén inmunodeprimidas por otros motivos.
 - e) Han tenido un contacto reciente con otra persona con enfermedad infecciosa de tuberculosis.



91. Identifique cuál de las siguientes vacunas y momento de administración sería el INCORRECTO en el caso de mujeres embarazadas o en edad fértil:
- a) La triple vírica está indicada durante el embarazo si en la serología de control no se detecta inmunidad.
 - b) Toda mujer en edad fértil que no haya pasado la enfermedad ni haya sido vacunada es candidata a la vacunación frente a la varicela. Se administrarán dos dosis con un intervalo de al menos 4 semanas entre las dosis. Las mujeres deberán evitar embarazo en las 4 semanas siguientes a cada dosis administrada.
 - c) Se recomienda vacunar frente a la tosferina a las embarazadas entre las semanas 27 y 36 de gestación. Se debe vacunar en cada nuevo embarazo, independientemente de cuando se haya recibido la última dosis y de si se ha vacunado en un embarazo anterior.
 - d) Se puede vacunar frente a la tosferina y la gripe en la misma visita de seguimiento del embarazo en el centro sanitario, pero cada una en un brazo diferente. También pueden administrarse en días diferentes sin necesidad de guardar ningún intervalo de tiempo determinado.
 - e) La vacuna frente a la gripe está indicada en cualquier trimestre de embarazo durante la campaña de vacunación
92. Identifique la herramienta que se utiliza para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía personal y de respeto a sí mismo:
- a) Test de Richmond.
 - b) Cuestionario de Salud SF – 12.
 - c) Escala de Goldberg.
 - d) Escala de Rosemberg.
 - e) Test de Morisky-Green.
93. Identifique cuál de las siguientes escalas se utiliza para seguir de una forma global la evolución de la Demencia del anciano y para definir sus etapas:
- a) Cuestionario DUKE-UNK.
 - b) Global deterioration scale.
 - c) Escala de Rosemberg.
 - d) Índice de Katz.
 - e) Test de Yesavage.
94. La escala de Ramsay se utiliza para:
- a) Medir el grado de sobrecarga subjetiva de los cuidadores de determinadas personas dependientes.
 - b) Valoración del estado de sedación del paciente.
 - c) Valoración funcional del paciente.
 - d) Valoración cognitiva del paciente.
 - e) Valoración del área afectiva del paciente.



95. T.L.M. de 72 años, vive sola en su casa. Su Enfermera de Atención Primaria de referencia acude a su domicilio. Tras la valoración de los riesgos del hogar, indique la recomendación correcta:
- a) Poner alfombras al suelo. En el caso de caídas amortigua el golpe.
 - b) Los artículos y utensilios de cocina que utiliza más a menudo los debería situar en los armarios y estanterías superiores, puesto que tenerlos en la encimera limita el espacio para trabajar y supone un riesgo de seguridad.
 - c) Eliminar la alfombrilla antideslizante del suelo de la ducha, puesto que se ha demostrado su efecto solo en bañeras, y recomendarle utilizar asidero del toallero instalado junto a la misma, como apoyo para salir.
 - d) Mantenga el suelo libre de objetos.
 - e) Usar abrillantadores para limpiar el suelo.
96. El siguiente símbolo utilizado en el genograma identifica a: 
- a) Paciente identificado.
 - b) Hombre.
 - c) Embarazada.
 - d) Cuidadora principal.
 - e) Mujer.
97. El instrumento que permite obtener, en forma gráfica y esquemática, información de la familia tal como es percibida por el miembro que la dibuja, se denomina:
- a) Genograma.
 - b) Ecomapa.
 - c) Ficha familiar.
 - d) APGAR familiar.
 - e) Círculo familiar.
98. Atendiendo al Ciclo Vital Familiar (CVF), seleccione la respuesta correcta:
- a) La etapa de contracción completa abarca desde la muerte del primer cónyuge hasta la muerte del cónyuge sobreviviente.
 - b) La etapa de extensión abarca desde la consolidación de la pareja hasta el nacimiento del primer hijo.
 - c) La OMS define siete etapas en el CVF.
 - d) La etapa de formación abarca desde el nacimiento del primer hijo hasta el nacimiento del último hijo.
 - e) Existen otros modelos de Ciclo Vital Familiar como el propuesto por Geyman y Duvall.



99. En acción comunitaria, son activos de las organizaciones:
- Comercios locales.
 - Espacios verdes y edificios entre otros.
 - Talentos locales culturales que reflejen su identidad y valores.
 - Servicios sociales, educativos y sanitarios entre otros.
 - Negocios.
100. En relación con Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud, es FALSO que:
- Tendrán consideración de alumnos, los residentes en formación en ciencias de la salud.
 - El número máximo de personas en formación de presencia física ante el paciente no podrá exceder de cinco.
 - A partir del segundo año de formación, los residentes tendrán acceso directo al paciente de forma progresiva y según las indicaciones de su tutor de las que se informará a los especialistas de la unidad asistencial.
 - El protocolo de compromiso de confidencialidad se entregará al personal en formación en los centros sanitarios en el momento de su incorporación para su firma.
 - Tanto residentes como alumnos están sometidos al deber de confidencialidad/secreto, no solo durante la estancia en el Centro sanitario en el que se esté formando sino también una vez concluida la misma, sin que dicho deber se extinga por la defunción del paciente.



PREGUNTAS DE RESERVA

101. Con relación al diagnóstico: Riesgo de tensión arterial inestable (00267) es cierto que:
- Corresponde a la clase 4. Respuestas cardiovasculares/pulmonares.
 - Fue de los primeros diagnósticos incluidos en la clasificación de diagnósticos de Enfermería.
 - Pertenece al Dominio 3: Eliminación e intercambio.
 - Es una intervención de enfermería NIC.
 - Es un resultado de Enfermería NOC.
102. Identifique cuál de las siguientes sería una contraindicación temporal en la indicación y administración de una vacuna determinada:
- Intolerancia.
 - Hipopigmentación de la piel.
 - Reacción alérgica anafiláctica a una dosis previa de una vacuna o algún componente de la misma.
 - Encefalopatía de etiología desconocida aparecida en los 7 días siguientes a la administración de una vacuna con componente frente a la tosferina.
 - Edad del paciente.
103. A la hora de formular los objetivos de un proyecto de investigación, identifique la opción INCORRECTA:
- Se temporaliza el alcance del objetivo general y los objetivos específicos teniendo en cuenta la duración del proyecto.
 - Se identifica el contexto del estudio donde se realizará la investigación.
 - Se observa que los sujetos de estudio aparecen dentro de la formulación del objetivo.
 - Los objetivos se inician con un verbo.
 - No se incluye se incluye el evento en estudio o el objeto de estudio.



104. En relación con la administración de vacunas intramusculares en la infancia, seleccione la opción correcta:
- a) Entre los 24 y 36 meses, es aconsejable valorar la musculatura de cada paciente para elegir el lugar adecuado. A partir de los 24 meses, la región anatómica más aconsejable y de mayor preferencia es el deltoides. A pesar de ello es mejor valorar individualmente en cada niño que el músculo tiene suficiente grosor y está bien desarrollado.
 - b) Está aconsejada, especialmente en los lactantes, la inyección intramuscular en la región glútea (cuadrante superior externo de los glúteos).
 - c) Las vacunas que contienen adyuvantes deben inyectarse de forma subcutánea o intradérmica.
 - d) La elección de la aguja debe realizarse en función de la edad y lugar anatómico de punción.
 - e) En los recién nacidos, lactantes y niños menores de 18 meses, el lugar indicado es la zona superior y anterolateral del muslo correspondiente a la masa muscular del vasto externo.
105. Con relación a la técnica de control del INR con sangre capilar en usuarios que toman anticoagulantes orales antagonistas de la vitamina K, sería INCORRECTO:
- a) La zona de punción debe ser en el extremo más distal y lateral de un dedo de la mano, evitando las yemas, preferentemente en el 3er o 4º dedo.
 - b) No se recomienda usar alcohol para limpiar la zona de punción previamente.
 - c) Si presenta manos muy frías o con vasoconstricción este lavado de mano contribuirá a que mejore el riego sanguíneo y a que se recoja mejor la gota de sangre.
 - d) Es importante recoger la gota de sangre antes de que transcurran 15 segundos de la punción ya que si no se falsearía el resultado de la medición porque ya habría comenzado el proceso de la coagulación.
 - e) No se recomienda el lavado de manos del paciente con agua tibia y jabón y secado de las mismas.



106. ¿Cuál de los siguientes criterios se debe aplicar, según la actual cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, respecto al cribado poblacional de cáncer de cérvix?
- a) En mujeres con edades comprendidas entre 25 y 34 años se debe recomendar una citología cada 3 años.
 - b) En una mujer entre 35-65 años que se indique determinación de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR), si resulta positivo, se debe realizar un triaje con citología y si citología negativa: repetir prueba VPH-AR a los 5 años.
 - c) En una mujer entre 35-65 años que se indique determinación de papiloma humano de alto riesgo (VPH-AR), si resulta negativo, repetir prueba VPH-AR a los 3 años.
 - d) Este programa no ha sufrido modificaciones dentro de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en el ámbito de salud pública desde su publicación en 2006.
 - e) Población objetivo son mujeres con edades comprendidas entre 20 y 70 años.
107. Con relación a los Progestágenos inyectables es cierto que:
- a) Está contraindicada su aplicación en el caso de tener enfermedades mentales.
 - b) La primera inyección debe aplicarse el primer día de la menstruación.
 - c) Se presentará la menstruación 4 semanas después de la aplicación.
 - d) Si se aplica a los 35 días después de la inyección anterior se tendrá protección contraceptiva.
 - e) Se debe realizar masaje adicional en el sitio de aplicación para favorecer la absorción.



108. Con relación al Artículo 15 del Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero, por el que se determinan y clasifican las especialidades en Ciencias de la Salud y se desarrollan determinados aspectos del sistema de formación sanitaria especializada, y en el que se exponen aspectos referentes a la responsabilidad progresiva del residente, señale la respuesta INCORRECTA:
- a) El sistema formativo implicará la asunción progresiva de responsabilidades en la especialidad que se esté cursando y un nivel creciente de supervisión, a medida que se avanza en la adquisición de las competencias previstas en el programa formativo, hasta alcanzar el grado de responsabilidad inherente al ejercicio autónomo de la profesión sanitaria de especialista.
 - b) La supervisión de residentes de primer año de formación será de presencia física y se llevará a cabo por los profesionales que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad por los que el personal en formación esté rotando o prestando servicios de atención continuada.
 - c) Los especialistas que supervisan la formación visarán por escrito las altas, bajas y demás documentos relativos a las actividades asistenciales en las que intervengan los residentes cualquier año formativo.
 - d) Las comisiones de docencia elaborarán protocolos escritos de actuación para graduar la supervisión de las actividades que lleven a cabo los residentes en áreas asistenciales significativas, con referencia especial al área de urgencias o cualesquiera otras que se consideren de interés.
 - e) Los residentes se someterán a las indicaciones de los especialistas que presten servicios en los distintos dispositivos del centro o unidad, sin perjuicio de plantear a dichos especialistas y a sus tutores cuantas cuestiones se susciten como consecuencia de dicha relación.
109. Identifique cuál de las siguientes opciones se corresponde con una herramienta que permite crear bases de datos personales de referencias bibliográficas:
- a) EndNote.
 - b) STROBE.
 - c) MEDLINE.
 - d) CASPe.
 - e) Fichas FLC 2.0.



110. Con relación a los criterios de acreditación para el nombramiento de tutores de Enfermería Familiar y Comunitaria, es FALSO que:
- a) Actualmente uno de los requisitos exigidos para la acreditación es situación de servicio activo, con una experiencia acreditada y continuada en el ámbito profesional de la Enfermería Familiar y Comunitaria en los últimos 5 años
 - b) Actualmente uno de los criterios exigidos para la acreditación es haber participado en 1 proyecto de investigación y/o comunicación científica específicos de Enfermería Familiar y Comunitaria, en los últimos 5 años.
 - c) Los requisitos actuales exigidos para el nombramiento de tutores se sustituirán de forma transitoria y durante un periodo máximo de 2 años desde la finalización de la prueba de evaluación de la competencia.
 - d) Se tiene en cuenta como requisitos para la acreditación para ser tutor de esta especialidad aspectos relacionados con el perfil clínico, docente e investigador de la totalidad de su trayectoria profesional.
 - e) Los criterios de acreditación vienen recogidos en Orden PRE/861/2013, de 9 de mayo, por la que se establecen los requisitos de acreditación de las unidades docentes multiprofesionales para la formación de especialistas en enfermería familiar y comunitaria y en medicina familiar y comunitaria.