

Definiciones coberturas de vacunación en España desde 2017

Las definiciones utilizadas para el cálculo de coberturas de vacunación fueron desarrolladas por la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones y acordadas por la Comisión de Salud Pública en octubre de 2017.

- **Primovacunación en menores de 12 meses:**
 - Vacuna hexavalente. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con al menos 2 dosis de vacuna frente a poliomielitis (VPI), difteria, tétanos y tosferina (DTPa), *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) y hepatitis B (HB).
 - Meningococo C (MenC). Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna MenC.
 - Neumococo (VCN). Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 2 dosis de VNC.
- **Vacunación de recuerdo en población infantil:**
 - Vacuna hexavalente. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con al menos 3 dosis de vacuna frente a poliomielitis (VPI), difteria, tétanos y tosferina (DTPa), *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) y hepatitis B (HB).
 - Meningococo C (MenC). Porcentaje de niños y niñas, de una corte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna MenC después de los 12 meses de edad.
 - Neumococo (VCN). Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con al menos 3 dosis de vacuna frente a neumococo (VNC).
 - Difteria, tétanos y tosferina de baja carga (dTpa). Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con una dosis de vacuna dTpa.
 - Polimiolielitis (VPI): Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con una vacuna frente a poliomielitis (VPI) a partir de los 6 años de edad.
- **Vacunación frente a sarampión, rubéola y parotiditis (triple vírica, TV):**
 - *Primera dosis*. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de TV después de los 12 meses de edad.
 - *Segunda dosis*. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 2 dosis de TV después de los 12 meses de edad.
- **Vacunación frente a varicela (VVZ) en la infancia:**
 - *Primera dosis*. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna VVZ.
 - *Segunda dosis*. Porcentaje de niños y niñas, de una cohorte determinada, vacunados con 2 dosis de vacuna VVZ.
- **Vacunación en adolescentes:**
 - Tétanos y difteria de baja carga (Td). Porcentaje de adolescentes, de una cohorte determinada, que han recibido una dosis de vacuna Td.
 - Meningococo C (MenC). Porcentaje de adolescentes, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna MenC después de los 10 años de edad.
 - Meningococo ACWY (MenACWY): Porcentaje de adolescentes, de una cohorte determinada, vacunados con 1 dosis de vacuna MenACWY después de los 10 años de edad.

- Varicela (VVZ). Porcentaje de adolescentes susceptibles, de una cohorte determinada, vacunados con 2 dosis de vacuna VVZ después de los 10 años de edad.
- Virus del papiloma humano (VPH):
 - *Primera dosis*. Porcentaje de niñas, de una cohorte determinada, vacunadas con 1 dosis de VPH.
 - *Segunda dosis*. Porcentaje de niñas, de una cohorte determinada, vacunadas con al menos 2 dosis de VPH.
- **Vacunación frente a difteria, tétanos y tosferina (dTpa) en embarazadas:** porcentaje de embarazadas que han recibido 1 dosis de dTpa durante el año analizado.
- **Vacunación frente a la gripe:**
 - **Personas ≥ 75 años.** Porcentaje de personas ≥ 75 años que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.
 - **Personas de 65-74 años.** Porcentaje de personas de 65-74 años que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.
 - **Personas de 60-64 años.** Porcentaje de personas de 60-64 años que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.
 - **Embarazadas.** Porcentaje de embarazadas que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.
 - **Personal sanitario.** Porcentaje de profesionales que han recibido una dosis de vacuna frente a la gripe en la temporada estacional indicada.