

Guía Técnica de Vacunación: Comparativa de Protocolos y Administración

Referencia rápida para personal sanitario sobre marcas comerciales, rangos de edad, seguridad en embarazo y requisitos de preparación.

VACUNAS HEXAVALENTES (DTPa+VHD+VPI+Hib)

MARCAS Y EDAD RECOMENDADA

Infanrix Hexa
Vaxelis
Hexyon

6
semanas
a 10 años

EMBARAZO

  No procede

PREPARACIÓN

 

Infanrix Hexa:
Reconstitución
OBLIGATORIA

Vaxelis y Hexyon:
No Requieren
Preparación
Previa

VACUNAS SRP (TRIPLE VÍRICA) (Sarampión, Rubéola, Parotiditis)

MARCAS Y EDAD RECOMENDADA

Priorix®
M-M-RVAXPRO®

Min. 12
meses

EMBARAZO

  Contraindicación absoluta

PREPARACIÓN



Ambas Marcas:
Reconstitución obligatoria
Antes de la Administración

VACUNAS Td (Tétanos y Difteria)

MARCAS Y EDAD RECOMENDADA

Ditebooster®
Diftavax®

Min.
5 años
Min.
7 años

EMBARAZO

 Balance riesgo-
beneficio favorable

PREPARACIÓN



Ambas Marcas:
Administración directa.
No Requieren Reconstitución
Previa

VACUNAS DE VARICELA

MARCAS Y EDAD RECOMENDADA

Varivax®
Varilrix®

Min.
1 año

EMBARAZO

  Contraindicada

PREPARACIÓN



Ambas Marcas:
Reconstitución
previa
obligatoria

VACUNAS VPI (POLIO INACTIVADA)

MARCA Y EDAD RECOMENDADA

Imovax Polio®

Min. 2
meses

EMBARAZO

 Balance riesgo-
beneficio favorable

PREPARACIÓN



Lista para usar:
No Requiere
Reconstitución



Requiere
Reconstitución



Lista para Usar/
Administración Directa



Edad
Recomendada



Contraindicada
en Embarazo



Evaluación
Riesgo-Beneficio