

%54

GIB DIAGNOSTIKO BERRIEN

gizonekin sexu-harremana duten gizonei (GSG) egiten zaizkie.



35

Batez besteko adina

GSGen

%38,4

diagnostiko berantiarra zuten. (<350 CD4**)

3

diagnostikotik

1

< 30 urtetik beherakoa da

GSGen artean

3

sifilis- eta gonokozia-kasutik aho-sexu

1

bidez transmititu da

GIB

2015ean Espainian 1.837 GIB kasu berri diagnostikatu ziren GSGen artean

10

GSGetik

1ek

Arrisku-praktikak dituzten, GIBak eragindako infekzioa dauka

GSGen artean

3

sifilis-kasutik

1ek

GIB diagnostikoa ere bazuen

5

gonokozia-kasutik

1ek

Azken urteetan,

STI sexu-tansmisiozko infekzioak nabarmen hazi dira



● Gonokozikoa ● Sifilisa

ITURRIA: ZAINZA EPIDEMIOLOGIKOKO SARE NAZIONALA

>50%

STIen baino gehiago GSGen artean diagnostikatzen dira.

KONDOIRIK GABE ez dago atzera-bueltarik.



Iturria: HIESari buruzko Plan Nazionala
Informazio gehiago lortzeko:
<http://www.msc.es/ciudadanos/enflesiones/enftransmisibles/sida/home.htm>
<http://www.msc.es/ciudadanos/enflesiones/enftransmisibles/sida/homeITS.htm>

*Joerak (2009-2015): Egonkorra
• GSGen artean, GIB diagnostiko berrien tasa ez da jaitsi azken urteetan.
• Diagnostiko berantiarrek dituztenen ehunekoa ez da jaitsi azken urteetan.

**Immunitate-sistemaren oinarriko zati bat osatzen duten zelulak. Bereziki sistema aktibatzeaz arduratzen dira, hau da, sistemari patogenoen presentziak edo giza zelulen erreplikazio batez ohartarazten diote, horri aurre egiteko eta egoera zuzentzeko aukera izan dezan.