

La encuesta europea por Internet para HSH (EMIS) es el estudio internacional y multilingüe más amplio dirigido a los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), implementada entre octubre del 2017 y enero del 2018. En este segundo informe comunitario queremos de nuevo mostrarte algunos de los resultados relevantes que pueden ser de tu interés.


RESULTADOS CLAVES PARA LOS 13.000 HOMBRES DIAGNOSTICADOS DE VIH PARTICIPANTES EN 48 PAISES



Este segundo informe comunitario EMIS-2017, publicado el día mundial del Sida de 2020, está basado en los 13.172 (10%) hombres que indicaron haber tenido un diagnóstico por VIH y que viven en uno de los 48 países participantes que aparecen en el mapa. Nuestro agradecimiento a los 137.000 hombres que participaron en EMIS-2017. Este informe comunitario y el informe global están disponibles en: www.emis2017.eu

¿DÓNDE VIVES?

% de los participantes de EMIS-2017 diagnosticados con VIH



NÚMERO DE AÑOS CON DIAGNÓSTICO DE VIH



HEPATITIS

65%

recibieron todas las dosis de la vacuna contra la hepatitis A

73%

recibieron todas las dosis de la vacuna contra la hepatitis B

22%

tuvieron también un diagnóstico positivo frente a la hepatitis B o C

TU TRATAMIENTO PARA EL VIH

96%

estabais en seguimiento clínico de vuestra infección por VIH en los últimos 6 meses

90%

estabais en tratamiento antirretroviral (ARV)

82%

tenáis una carga viral indetectable

La cascada de servicios del VIH tiene mejor resultados en el norte y el oeste de Europa que en el sur y el este de Europa

EDAD, PAIS DE NACIMIENTO, RELACIÓN DE PAREJA

4%

14-24

36%

25-39

45%

40-54

12%

55-64

3%

65+

18%

nacieron en otro país

51%

solteros

7%

'No estoy seguro de tener una pareja estable / es complicado'


42%

Pareja estable

Entre el 42% de hombres con una pareja estable, un 43% tenía una pareja que también vivía con VIH.

La encuesta europea por Internet para HSH (EMIS) es el estudio internacional y multilingüe más amplio dirigido a los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), implementada entre octubre del 2017 y enero del 2018. En este segundo informe comunitario queremos de nuevo mostrarte algunos de los resultados relevantes que pueden ser de tu interés.

¿DÓNDE ENCONTRASTE A TU PAREJA OCASIONAL CON LA QUE TUVISTE SEXO POR ÚLTIMA VEZ?



DIAGNÓSTICOS DE ITS EN EL ÚLTIMO AÑO



SEXO SEGURO

82% tenían carga viral indetectable

44% de los que tenían carga viral detectable tuvieron sexo anal sin condón con parejas ocasionales de serostatus desconocido

18% usasteis siempre el condón durante el sexo con parejas ocasionales masculinas

18% afirmasteis tener pocas habilidades para negociar el sexo seguro

CONOCIMIENTO DE I=I

! 85%

de los hombres con VIH sabían que una persona con carga viral indetectable no puede transmitir el VIH. Entre todos los participantes (EMIS-2017 Núm. 1), este conocimiento sobre el I=I fue del 57%. Esto destaca la necesidad de continuar promoviendo el I=I entre hombres gays y bisexuales en general, y entre los hombres gays con VIH (y sus profesionales de salud) en particular.

VUESTRA SITUACIÓN ECONÓMICA

19% teníais dificultades económicas

7% no teníais empleo

5% estabais jubilados

4% estabais de baja laboral por enfermedad crónica

SALUD SEXUAL

19% estabais sexualmente insatisfechos (valor <5 en una escala del 1 al 10)

11% no encontrabais fácil decir "no" a una relación sexual que no queríais

71% no os habíais realizado una prueba de ITS en los últimos 12 meses

25% no habíais tenido nunca la oportunidad de vacunaros contra la hepatitis A y/o B

La encuesta europea por Internet para HSH (EMIS) es el estudio internacional y multilingüe más amplio dirigido a los hombres gays, bisexuales y otros hombres que tienen sexo con hombres (GBHSH), implementada entre octubre del 2017 y enero del 2018. En este segundo informe comunitario queremos de nuevo mostrarte algunos de los resultados relevantes que pueden ser de tu interés.

HOMOFOBIA SOCIAL

19%

os habían insultado en el último año

17%

afirmasteis que nadie o pocas personas de vuestro entorno conocían que os sentíais atraídos sexualmente por hombres

8%

mostrasteis señales de ansiedad severa y depresión

25%

pensasteis en "haceros daño" o que "sería mejor estar muerto"

Porcentaje de hombres con VIH que han usado drogas en el último año

63% usasteis
POPPERS46% usasteis
fármacos para
disfunción eréctil34% usasteis
cannabis23% usasteis
éxtasi
(pastillas o polvo)21% usasteis
cocaína16% usasteis
sedantes /
tranquilizantes

USO DE DROGAS

6%

os habíais inyectado drogas
(excluyendo esteroides) en el último año

17%

habíais usado drogas estimulantes para
que el sexo fuera más intenso o durara
más tiempo en las últimas 4 semanas

SERVICIOS DE REDUCCIÓN DE DAÑOS

! 18%

de todos los participantes con VIH teníais signos de dependencia al alcohol, pero solamente el 12% habíais consultado a un profesional de salud sobre este consumo.

! 10%

10% de todos los participantes con VIH estabais preocupados en cuanto a vuestro consumo de drogas, pero solamente el 21% habíais consultado a un profesional de salud sobre este consumo.

EMIS-2017

se realizó por Sigma Research (Londres) y fue financiada por el programa de salud (2014-2020) de la Unión Europea. Este informe comunitario Núm. 2 ha estado preparado por el Gay Health Network (Irlanda), Sigma Research, y financiado por el Health Service Executive (HSE), Irlanda. La versión en español de este informe comunitario ha sido realizada por el CEEISCAT y Stop Sida