



35

Idade media

54% DOS NOVOS DIAGNÓSTICOS

de VIH prodúcense en homes que teñen sexo con homes (HSH)

38,4%

dos HSH presentaban diagnóstico tardío (<350 CD4**)

1

de cada

3

novos diagnósticos ten menos de < 30 anos

VIH

No 2015 diagnosticáronse 1837 novos casos de VIH en HSH en España

1

de cada

10

HSH con prácticas de risco ten infección por VIH

1

de cada

3

casos de sífilis e gonococia en HSH transmitíronse a través do sexo oral

Nos últimos anos produciuse un aumento significativo das **infeccións de transmisión sexual (ITS)**

1

de cada

3

casos de sífilis

en HSH estaba tamén diagnosticado de VIH

>50%


das ITS diagnosticanse en HSH

1

de cada

5

casos de gonococia



● Gonocócica ● Sífilis

FONTE: REDE NACIONAL DE VIXILANCIA EPIDEMIOLÓXICA

SEN CONDÓN non hai volta atrás.



Fonte: Plan Nacional sobre a SIDA
Para máis información:
<http://www.msc.es/ciudadanos/enfInfecciones/enfTransmisibles/sida/home.htm>
<http://www.msc.es/ciudadanos/enfInfecciones/enfTransmisibles/sida/homeITS.htm>

*Tendencias (2009-2015): Estable
• A taxa de novos diagnósticos de VIH entre os HSH non descende nos últimos anos.
• A porcentaxe de casos con diagnósticos tardíos non descende nos últimos anos.

**Tipo de células que constitúen unha parte esencial do sistema inmunitario. A súa función principal é a de activar o propio sistema alertándoo da presenza de patóxenos ou dunha replicación errónea de células humanas, para que poida facerlles fronte e corrixi-la situación.