ESTUDIO CIS nº 3574

BARÓMETRO SANITARIO 2026 (Segunda oleada)

FICHA TÉCNICA

DISEÑO MUESTRAL GENERAL DEL BARÓMETRO SANITARIO 2026

Convenio:

Ministerio de Sanidad.

Ámbito:

Nacional.

Universo:

Población residente en España de ambos sexos de 18 años y más.

Tamaño de la muestra:

7.800 entrevistas, distribuidas en tres submuestras de 2.600 entrevistas cada una.

Afijación:

No proporcional. Tras asignar 250 entrevistas a cada una de las 17 comunidades autónomas, excepto en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla donde se asignan 120 entrevistas, el resto, hasta 7.800, se distribuye proporcionalmente según la población residente.

A partir de la afijación realizada se procede a la desagregación de la muestra general en tres submuestras (oleadas) de 2.600 entrevistas. Esta desagregación se hace de forma que en cada submuestra estén presentes todos los estratos con igual número de entrevistas. La distribución se incluye en el Cuadro 1.

Ponderación:

Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar coeficientes de ponderación (PESO)[1]. Los valores medios por comunidad autónoma se incluyen en la ficha técnica de la submuestra correspondiente.

Para la estimación a nivel de cada autonomía, en el fichero de microdatos se incluye la ponderación para cada una de ellas (variable PESOCCAA).

Período de referencia:

El Barómetro Sanitario 2026 abarca el período de tiempo que va desde marzo a octubre de 2026. La muestra se ha dividido en 3 submuestras distintas, que corresponden a las tres oleadas del Barómetro. Cada oleada, 2.600 entrevistas, tiene representatividad nacional y sus resultados reflejan la situación del país en el período de celebración de las entrevistas. El Barómetro en su conjunto, esto es, la agregación de las 3 submuestras refleja la situación media del período.

[1] Para más información sobre la ponderación pueden consultar en: https://www.cis.es/es/estudios/metodologia/muestra-y-ponderacion

Procedimiento de muestreo:

Se procede a la selección aleatoria de teléfonos fijos y móviles; los porcentajes por el tipo de teléfono utilizado en la realización de las entrevistas se incluyen en la ficha técnica de la submuestra correspondiente.

La selección de las personas se ha llevado a cabo mediante la aplicación de cuotas de sexo y edad.

Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menos o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.

Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI).

Error muestral:

El conjunto de la muestra, para un nivel de confianza del 95,5%, P=Q y en el supuesto de muestreo aleatorio simple, tiene un error de muestreo del ±1,1%.

Las muestras de cada una de las comunidades autónomas suponen errores de muestreo distintos en función del número de entrevistas. Como punto de referencia se señala que en submuestras con 300 entrevistas el error de muestreo, para un nivel de confianza del 95,5 por ciento en el supuesto de muestreo aleatorio simple, es de ± 5,8%; en submuestras de 400 entrevistas es de ± 5%, y en las de 600 entrevistas es de ± 4,1%.

Cuadro 1. Distribución de las entrevistas por comunidades autónomas y oleadas.

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	TOTAL	Oleada Submuestra 1	Oleada Submuestra 2	Oleada Submuestra 3
01. Andalucía	828	276	276	276
02. Aragón	342	114	114	114
03. Asturias (Principado de)	321	107	107	107
04. Balears (Illes)	333	111	111	111
05. Canarias	405	135	135	135
06. Cantabria	291	97	97	97
07. Castilla-La Mancha	393	131	131	131
08. Castilla y León	417	139	139	139
09. Cataluña	795	265	265	265
10. Comunitat Valenciana	615	205	205	205
11. Extremadura	321	107	107	107
12. Galicia	438	146	146	146
13. Madrid (Comunidad de)	726	242	242	242
14. Murcia (Región de)	354	118	118	118
15. Navarra (Comunidad Foral de)	294	98	98	98
16. País Vasco	402	134	134	134
17. Rioja (La)	273	91	91	91
18. Ciudad autónoma de Ceuta	126	42	42	42
19. Ciudad autónoma de Melilla	126	42	42	42
TOTAL	7.800	2.600	2.600	2.600

BARÓMETRO SANITARIO 2026

SEGUNDA OLEADA

DISEÑO DE LA SUBMUESTRA

Tamaño de la muestra:

Diseñada: 2.600 entrevistas.
Realizada: 2.644 entrevistas.

Afijación:

No proporcional.

Ponderación:

Para tratar la muestra en su conjunto es necesario aplicar coeficientes de ponderación (PESO). Los valores medios de estos coeficientes se adjuntan en el Cuadro 2, al final de esta ficha técnica.

Para la estimación a nivel de cada autonomía, en el fichero de microdatos se incluye la ponderación para cada una de ellas (variable PESOCCAA).

Puntos de muestreo:

953 municipios y 50 provincias.

Teléfonos:

Se ha procedido a la selección aleatoria de teléfonos fijos y móviles con un porcentaje del 15,6% y del 84,4%, respectivamente.

Error muestral:

La submuestra, para un nivel de confianza del 95,5%, P=Q y en el supuesto de muestreo aleatorio simple, tiene un error de muestreo del ±1,9%.

Las submuestras de cada una de las comunidades autónomas tienen asociados errores elevados, dado el reducido tamaño de muestra utilizado.

Fecha de realización:

Del 21 al 24 de julio de 2026.

Cuadro 2. Muestra realizada y coeficientes de ponderación

COMUNIDADES AUTÓNOMAS	Muestra realizada	Coeficientes de ponderación
01. Andalucía	314	1,445
02. Aragón	118	0,687
03. Asturias (Principado de)	102	0,559
04. Balears (Illes)	109	0,643
05. Canarias	131	0,961
06. Cantabria	93	0,308
07. Castilla-La Mancha	131	1,015
08. Castilla y León	148	0,842
09. Cataluña	301	1,446
10. Comunitat Valenciana	217	1,406
11. Extremadura	101	0,664
12. Galicia	148	1,055
13. Madrid (Comunidad de)	252	1,299
14. Murcia (Región de)	117	0,769
15. Navarra (Comunidad Foral de)	86	0,422
16. País Vasco	136	0,921
17. Rioja (La)	78	0,226
18. Ciudad autónoma de Ceuta	32	0,159
19. Ciudad autónoma de Melilla	30	0,169
TOTAL	2.644	