



Utilización de medicamentos crónicos


Medicamento crónico: el que se consume al menos 6 meses en un año. Proxy BDCAP: fármacos con 180 o más Dosis Diarias Definidas (DDD) dispensadas en el año.

Saber más¹




Distribución de la población por frecuencia de utilización de medicamentos

Hombre



6,8 millones

Mujer




9,6 millones

Un tercio de los hombres no utiliza ninguna medicación, aproximadamente otro tercio consume al menos un fármaco de forma crónica y el resto consume al menos un envase

Hay 10 puntos más de mujeres con medicación crónica que hombres y, en paralelo, 10 puntos menos de mujeres que no utilizan ninguna medicación

% de personas con al menos 1 medicamento crónico en el año Distribución por grupos de edad y sexo



Entre los 15-34 años, las mujeres utilizan algún fármaco de forma crónica, 3 veces más que los hombres

El % de personas con al menos una medicación crónica, aumenta progresivamente con la edad

¹ https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/5FARMACOS_CONSUMO.pdf

Distribución de la población por número de medicamentos consumidos

El consumo de 5 o más medicamentos ocurre a partir de los 65 años, y fundamentalmente desde los 75.

Ambos sexos (%)

| | Total | 00-14 años | 15-34 años | 35-64 años | 65-74 años | 75-84 años | 85-94 años | 95 años y más |
|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| ≥ 10 Medicaciones crónicas | 0,9 | 0 | 0 | 0,4 | 2,4 | 4,9 | 5,2 | 1,9 |
| 5-9 Medicaciones crónicas | 7,3 | 0 | 0,2 | 3,9 | 19,6 | 33,2 | 39,9 | 28,4 |
| 4 Medicaciones crónicas | 3,5 | 0 | 0,2 | 2,7 | 9,6 | 12 | 12,6 | 11,6 |
| 3 Medicaciones crónicas | 4,6 | 0,1 | 0,6 | 4,5 | 12,2 | 12,8 | 11,8 | 11,7 |
| 2 Medicaciones crónicas | 6,7 | 0,3 | 2 | 7,9 | 14,7 | 12,3 | 10 | 10,8 |
| 1 Medicación crónica | 12 | 3,5 | 9,8 | 15,3 | 15,7 | 10,3 | 7,4 | 9,2 |
| Personas con med (No crónica) | 37,6 | 65,3 | 48,4 | 36,5 | 14,2 | 7,3 | 6,2 | 10,9 |
| Personas sin medicación | 27,4 | 30,9 | 38,8 | 28,9 | 11,6 | 7,2 | 6,8 | 9 |

El número de medicamentos crónicos se distribuye de forma similar en hombres y en mujeres sobre todo a partir de los 65 años.

Hombre (%)

| | Total | 00-14 años | 15-34 años | 35-64 años | 65-74 años | 75-84 años | 85-94 años | 95 años y más |
|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| ≥ 10 Medicaciones crónicas | 0,8 | 0 | 0 | 0,4 | 2,4 | 4,7 | 5,2 | 2,3 |
| 5-9 Medicaciones crónicas | 6,5 | 0 | 0,1 | 3,7 | 20,1 | 32,8 | 39,3 | 29,6 |
| 4 Medicaciones crónicas | 3,1 | 0 | 0,2 | 2,4 | 9,5 | 11,8 | 12,3 | 10,3 |
| 3 Medicaciones crónicas | 4,1 | 0,1 | 0,4 | 4 | 11,7 | 12,6 | 11,5 | 10,2 |
| 2 Medicaciones crónicas | 5,8 | 0,4 | 1,3 | 6,8 | 14,1 | 12,2 | 9,8 | 9,4 |
| 1 Medicación crónica | 9,7 | 3,8 | 4,9 | 12,6 | 15,1 | 10,3 | 7,5 | 8,2 |
| Personas con med (No crónica) | 37,6 | 65,5 | 46,5 | 35,3 | 14,2 | 7,7 | 6,8 | 10,6 |
| Personas sin medicación | 32,6 | 30,2 | 46,6 | 34,9 | 12,9 | 7,8 | 7,6 | 19,3 |

Mujer (%)


| | Total | 00-14 años | 15-34 años | 35-64 años | 65-74 años | 75-84 años | 85-94 años | 95 años y más |
|-------------------------------|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| ≥ 10 Medicaciones crónicas | 1 | 0 | 0 | 0,4 | 2,3 | 5 | 5,3 | 1,8 |
| 5-9 Medicaciones crónicas | 8,1 | 0 | 0,2 | 4,1 | 19,2 | 33,5 | 40,3 | 28 |
| 4 Medicaciones crónicas | 3,8 | 0 | 0,3 | 2,9 | 9,7 | 12,2 | 12,7 | 12 |
| 3 Medicaciones crónicas | 5,2 | 0,1 | 0,8 | 5 | 12,6 | 13 | 11,9 | 12,1 |
| 2 Medicaciones crónicas | 7,6 | 0,3 | 2,9 | 9 | 15,2 | 12,5 | 10,1 | 11,2 |
| 1 Medicación crónica | 14,3 | 3,1 | 14,9 | 18 | 16,3 | 10,2 | 1 | 9,5 |
| Personas con med (No crónica) | 37,5 | 65 | 50,4 | 37,7 | 14,3 | 6,9 | 5,9 | 10,9 |
| Personas sin medicación | 22,4 | 31,5 | 30,7 | 22,9 | 10,4 | 6,7 | 12,7 | 8,7 |

Polimedicados por variables de clasificación


Polimedicado: persona que consume 5 o más medicamentos crónicos a la vez.

Polimedicado severo: persona que consume 10 o más medicamentos crónicos a la vez.


Polimedicados. Distribución por edad y sexo



Polimedicados severos. Distribución por edad y sexo



Polimedicados. Distribución por variables de clasificación BDCAP (ajustada por edad)



Polimedicados severos. Distribución por variables de clasificación BDCAP (ajustada por edad)

