GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE SANIDAD

Anexo gráfico (Parte 2)

Caracterización de la población infantil según la presencia/ausencia de obesidad

Prevalencias o medias por edad y sexo

Razón de prevalencias o razón de medias por edad y sexo (entre personas con obesidad/sin obesidad).

Edades de estudio: 0, 1, 2, 4, 6, 12 y 14 años

Índice


	Claves de lectura	2
1.	Problemas de salud	3
	a) Resumen: los 45 problemas de salud por aparatos	4
	b) Prevalencia en cada edad	5
	c) Razón de prevalencias en cada edad	10
2.	Frecuentación en atención primaria (visitas)	27
3.	Interconsultas	29
	a) Interconsultas totales por mil y razón de medias	30
	b) Interconsultas en cada especialidad	31
	c) Razón de interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo	46
4.	Utilización de procedimientos	53
5.	Utilización de fármacos	58
	a) Total de DHD y razón de medias	59
	b) Resumen: 13 ATC por aparatos	60
	c) DHD en cada grupo ATC2	61
	d) Razón de DHD de los ATC2 en cada edad y sexo	80
6.	Parámetros nutricionales	82

Claves de lectura

Valor en niños/as sin obesidad

Valor en niños/as con obesidad

Intervalo de confianza 95%



Edades de estudio

Razón de prevalencias o Razón de medias= Tasa o media en niños/as con obesidad / Tasa o media en niños/as sin obesidad

Azul: significación estadística
Rojo: intervalo de confianza incluye la unidad

Responde a la pregunta: cuántas veces es mayor la frecuencia en los niños/as con obesidad frente a los sin obesidad.

Criterios de selección

Problemas de salud: prevalencia ≥ 1 ‰ y razón de prevalencias ≥ 1,2.
Visitas: todo contacto con atención primaria.
Interconsultas: todas para el total y, para el análisis de especialidades, aquellas con frecuencia ≥ 10 y razón de prevalencias ≥ 1,2.
Procedimientos: todos.
Fármacos: todos para el total y, para el análisis de los ATC, los 5 más frecuentes en cada y edad y razón de prevalencias ≥ 1,2.

1. Problemas de salud

a) Resumen: 45 problemas de salud por aparatos.
b) Prevalencia en cada edad.
c) Razón de prevalencias en cada edad.

1.a) Resumen: 45 problemas de salud por aparatos

Razón de prevalencias: responde a la pregunta: cuántas veces es mayor la frecuencia del PS en las personas con obesidad frente a las sin obesidad.

Clave de lectura

Se muestran los problemas de salud con prevalencia superior al 1‰ y con razón de prevalencias (entre personas con y sin obesidad) mayor o igual a 1,20.

El sombreado indica que el intervalo de confianza de la razón de prevalencia es estadísticamente significativo (95%).

M indica solo en mujer.

H indica solo en hombre.

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4	0
Problemas sociales	1,5	1,5	1,3	1,5	
Anomalias congénitas					1,3

P

PS	Edada 14	12	6	4	2	1	0
Síntomas psicológicos	1,3	1,3	1,3	1,3	1,6	1,5-M	1,5
T. personalidad	1,9	1,6	1,3	1,8			
T. hipercinéticos	1,2	1,3	1,4	2,0			
T. ansiedad	1,3	1,4	1,4	4,2			
Depresión	1,6	1,9					
Estrés postraumático	1,8	1,4		1,6			
T. somatización	1,6-M			1,7			

K

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6
Hipertensión arterial	7,4	6,7	4,8

L

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4
Def. miembros	1,3	1,5	2,0	2,3
Síntomas locomotor	1,3	1,3	1,3	1,2
Esguinces	1,9	1,7		
Osteocondrosis	1,3	1,5		
Fracturas	1,4-M	1,2		
Sd. columna vertebral	1,2			

B

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4	2	1
Anemia ferropénica	1,4-H	1,9	1,3	1,2	1,2	1,3

D

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	0
Enf. hepáticas NE	9,5	6,4	3,5	
A. Digestivo				1,4
Síntomas A. digestivo				1,6

XY

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4
Testículo no descen.	1,7-H	1,5-H	1,5-H	2,1-H
Vaginitis	1,3-M		1,5-M	1,6-M
Alt. menstruales	1,5-M	1,6-M		

N

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4	2	1
Epilepsia	1,4	1,2-M	1,2	1,4	1.6-H	2,7
Alt. Lenguaje	1,4	1,9	1,9	1,9	1,7-M	
Cefaleas	1,2-H		1,2	1,4		

F

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6
Ceguera	1,3	1,5	1,3-M

R

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4	2	1	0
Asma	1,3	1,5	1,6	1,2-H	1,7	1,4	2,4
Síntomas respiratorios		1,2	2,1	1,2		1,2	1,7
Infecc. respiratorias	1,2	1,2-H	1,2	1,2			1,4

S

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4	2	1	0
Sarna		1,4	1,3	1,4	1,4	2,3	4,8-H
Infecciones piel	1,2-M	1,2			1,3-H	1,7-H	1,3
Síntomas piel	1,2-M	1,2		1,3-H		1,2	1,2-H
Uña encarnada	1,5	1,6	1,2	1,5			
Dermatitis seborreica	1,4	1,3					
Quiste pilonidal	3,3	1,4					
Dermatitis de contacto						1,3	1,7
Dermatitis del pañal						1,3	1,3-H

T


Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4	2	1
Hipotiroidismo	1,7	2,0	1,8	1,6		
Déficit nutricional	1,6	1,6				
Trast. del metabolismo lipídico	2,3	2,1				
Prob. Alimentación					1,4	1,7
Diabetes mellitus	1,3					

U

Problema de salud	Edades / razón de prevalencia 14	12	6	4	2
Cistitis	1,9	1,3-M	1,9	1,4	1,8
Incontinencia urinaria	1,4	1,4			


(Prevalencia >1‰)

1.b) Prevalencia en cada edad




(Prevalencia >1‰)

1.b) Prevalencia en cada edad




(Prevalencia >1‰)


1.b) Prevalencia en cada edad



(Prevalencia >1‰)


1.b) Prevalencia en cada edad






(Prevalencia >1‰)

1.b) Prevalencia en cada edad






(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad y sexo


14 años, ambos sexos



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


14 años, hombre



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


14 años, mujer



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


12 años, ambos sexos



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


12 años, hombre



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


12 años, mujer



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


6 años, ambos sexos




(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad

6 años, hombre







(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad

6 años, mujer






(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


4 años, ambos sexos



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


4 años, hombre



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


4 años, mujer




(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


2 años, ambos sexos



Hombre




Mujer




(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad

1 años, ambos sexos




Hombre



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


1 años, mujer




(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad

0 años, ambos sexos




Hombre



(Prevalencia >1‰)

1.c) Razón de prevalencia en cada edad


0 años, mujer





2. Frecuentación en atención primaria

- Visitas/personas/año y razón de medias.

Visitas / personas / año y razón de medias










3. Interconsultas

a) Interconsultas totales por mil y razón de medias.
b) Interconsultas en cada especialidad.
c) Razón de Interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo.


3.a) Interconsultas totales por mil y razón de medias










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades




3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.b) Interconsultas por especialidades










3.c) Razón de interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo










3.c) Razón de interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo










3.c) Razón de interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo











3.c) Razón de interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo



















3.c) Razón de interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo















3.c) Razón de interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo











3.c) Razón de interconsultas de las especialidades en cada edad y sexo


















4. Utilización de procedimientos


- Procedimientos por mil y razón de medias.



Procedimientos de Imagen (‰) Ambos sexos
Sin cobesidad
Con obesidad
500
400
300
200
100
0
373,7
249,2
242,7
255,1
146,7
143,1
71,4
67,7
87,9
115,9
214,4
248,2
234,1
244,0
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
1,4
1,0
0,7
0,3
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años



Nº Proced. Imagen/1000 personas. Niños
Sin cobesidad
Con obesidad
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
380,4
258,8
244,6
254,0
160,0
105,7
75,2
78,4
87,0
110,1
208,5
265,0
246,1
238,3
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
1,8
1,3
0,8
0,3
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años



Nº Proced. Imagen/1000 personas . Niñas
Sin cobesidad
Con obesidad
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
366,8
234,3
240,8
256,9
132,4
176,2
67,4
57,7
88,8
120,9
220,4
230,2
221,6
251,6
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
1,8
1,3
0,8
0,3
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años



Procedimientos laboratorio (‰). Ambos sexos
Sin cobesidad
Con obesidad
10000
8000
6000
4000
2000
0
444,4
1.945,1
2.891,0
2.390,9
2.488,7
2.411,4
2.560,3
2.399,3
3.516,6
3.275,2
6.780,5
5.093,4
8.265,9
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
2,4
1,7
1,0
0,3
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años



Nº Proced. Laboratorio/1000 personas. Niños
Sin obesidad
Con obesidad
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
484,1
514,8
2.061,2
4.079,0
2.554,4
3.690,4
2.534,8
2.573,8
2.315,8
3.699,6
2.919,1
6.573,1
4.401,2
7.577,6
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
3,2
2,2
1,2
0,2
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años



Nº Proced. Laboratorio/1000 personas. Niñas
Sin cobesidad
Con obesidad
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
402,4
332,5
1.822,1
1.261,0
2.216,1
1.870,9
2.286,7
2.548,6
2.489,1
3.352,2
3.642,8
7.012,9
5.817,1
9.169,9
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
2,1
1,5
0,9
0,3
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años



Procedimientos diagnósticos (‰). Ambos sexos
Sin cobesidad
Con obesidad
800
600
400
200
0
214,1
285,9
448,1
512,8
350,3
473,0
487,4
565,4
486,8
587,6
500,9
577,9
475,1
519,2
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
2,2
1,6
1,0
0,4
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años


Nº Proced. Diagnóstico/1000 personas. Niños
Sin cobesidad
Con obesidad
800
700
600
500
400
300
200
100
0
221,4
327,6
461,4
448,5
360,7
492,3
497,8
591,9
491,8
612,0
489,6
571,6
476,9
490,1
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
2,5
1,8
1,1
0,4
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años


Nº Proced. Diagnóstico/1000 personas. Niñas
Sin cobesidad
Con obesidad
700
600
500
400
300
200
100
0
206,4
223,2
433,9
606,9
339,0
456,4
476,4
542,6
481,3
565,7
512,5
584,8
473,2
557,5
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
2,4
1,7
1,0
0,3
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años


Procedimientos terapeúticos (‰). Ambos sexos
Sin cobesidad
Con obesidad
15000
10000
5000
0
11.753,0
12.520,0
14.720,5
14.050,9
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
1,3
1,0
0,7
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años


Nº Proced. Terapeúticos/1000 personas. Niños
Sin cobesidad
Con obesidad
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
11.771,8
12.489,5
14.768,7
13.861,7
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
1,6
1,3
1,0
0,7
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años


Nº Proced. Terapeúticos/1000 personas. Niñas
Sin cobesidad
Con obesidad
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
11.733,3
12.565,0
14.669,0
14.348,1
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Razón Con Obesidad/Sin Obesidad
1,6
1,3
1,0
0,7
0 años
1 año
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años


5. Utilización de fármacos


a) Total de DHD* y razón de medias.
b) Resumen: 13 ATC2** por aparatos
c) DHD en cada grupo ATC2.
d) Razón de DHD de los ATC2 en cada edad y sexo.


*DHD = Dosis diaria definida ‰ habitantes y día.
https://www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/estadisticas/estMinisterio/SIAP/5FARMACOS_CONSUMO.pdf

**ATC2 = segundo nivel de la Clasificación Anatómico Terapéutica-clínica.

5.a) Total de DHD y razón de medias








5.b) Resumen: 13 ATC2 por aparatos

ATC		Edades / razón de prevalencia						
		0	1	2	4	6	12	14
H02	Corticosteroides	2,4	2,0	1,3	1,6	2,0	1,8	1,5-M
R06	Antihistamínicos	2,5	1,7		1,4	1,7	1,3	1,3
M01	AINES	1,7	1,4		1,4	1,6	1,7	1,5
J01	Antibióticos		1,3		1,3	1,4	1,6	1,3
N02	Analgésicos	1,3	1,2		1,2			
A11	Vitaminas				1,2		2,2	2,1

ATC		Edades / razón de prevalencia						
		0	1	2	4	6	12	14
R03	Inhaladores bronquiales	1,4	1,7	1,4	1,5	1,9	1,7	1,6
R01	Preparaciones nasales		1,9		1,5	1,8	1,3	1,3

ATC		Edades / razón de prevalencia
		2
B03	Antianémicos	4,3
B03B	Vitamina B12 y ácido fólico	7,2





ATC		Edades / razón de prevalencia	
		12	14
N06B	Psicoestimulantes	1,3	2,2-M
N06A	Antidepresivos		3,7


ATC		Edades / razón de prevalencia			
		0	1	4	6
S02	Otológicos		1,3	1,2	1,2-H
S01	Oftalmológicos	1,3			1,2

ATC	Fármaco	Edades / razón de prevalencia					
		0	1	2	4	6	14
D07	Corticoides tópicos	1,5	1,5	1,2	1,4-M	1,3	
P03	Escabicidas		3,3	3,4	2,1	1,6	
D06	Antibióticos tópicos	1,5		1,2	1,3	1,3	
D01	Antifúngicos tópicos	3,0	2,0	1,8			2,0


5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.c) DHD en cada grupo ATC2










5.d) Razón de DHD de los ATC2 en cada edad y sexo







5.d) Razón de DHD de los ATC2 en cada edad y sexo






5.d) Razón de DHD de los ATC2 en cada edad y sexo






5.d) Razón de DHD de los ATC2 en cada edad y sexo





6. Parámetros nutricionales

- Valor medio y razón de medias.


Glucemia



Glucemia. Ambos sexos
Sin obesidad
Con obesidad
95
90
85
80
75
70
80,5
85,6
77,5
83,5
81,2
83,1
85,7
87,4
84,4
87,2
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Diferencia Con Obesidad/Sin Obesidad
20,0
10,0
0,0
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años



mg/dl
Glucemia.Niños
Sin obesidad
Con obesidad
95
90
85
80
75
70
65
80,9
86,8
78,2
85,9
82,2
84,5
86,2
87,1
86,0
87,2
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Diferencia Con Obesidad/Sin Obesidad
20,0
10,0
0,0
-10,0
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años


mg/dl
Glucemia.Niñas
Sin obesidad
Con obesidad
100
80
60
40
20
0
79,9
84,2
76,7
81,0
80,1
81,6
85,4
87,7
83,1
87,2
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años
Diferencia Con Obesidad/Sin Obesidad
15,0
10,0
5,0
0,0
-5,0
2 años
4 años
6 años
12 años
14 años


Colesterol total










Presión arterial sistólica










Presión arterial diastólica











Problemas de salud más prevalentes en personas con obesidad


(Prevalencia e IC al 95%). Sin obesidad Con obesidad [4,6,12 y 14 años]




Problemas de salud más prevalentes en personas con obesidad
(Prevalencia e IC al 95%).
Sin obesidad
Con obesidad
[6,12 y 14 años]
Con escala especial
Hipertensión arterial (K86, 87)
Enf. hepáticas NE (D97)
Hipotiroidismo /mixedema (T86)
Trast. hipercinéticos (P81)
Asma (R96)
Signos/síntomas locomotor
Infecc. respiratorias (R72,R74,R76..R78,R83)
0,0 0,2
0,2 1,1
0,3 1,8
0,0 0,1
0,1 0,8
0,2 1,5
0,6 1,0
1,5 2,9
1,9 3,1
1,4 1,9
4,9 6,1
5,5 6,7
10,5 16,0
14,9 20,3
15,7 20,0
6,6 8,5
17,5 21,2
19,0 22,9
45,3 49,4
36,1 38,8
34,1 37,4
6
12
14


Problemas de salud más prevalentes en personas con obesidad

(Prevalencia e IC al 95%). Sin obesidad Con obesidad [12 y 14 años]



Problemas de salud más prevalentes en personas con obesidad

(Prevalencia e IC al 95%). Sin obesidad Con obesidad [4,6,12 y 14 años]



© MINISTERIO DE SANIDAD
CENTRO DE PUBLICACIONES
PASEO DEL PRADO, 18-20
28014 Madrid

NIPO en línea: 133-25-131-7

https://cpage.mpr.gob.es/