

TEST
PSIQUIATRÍA

1. El residente que realiza la rotación de Infante Juvenil con usted le pregunta cómo manejar a un padre claramente ansioso que trae a su hijo de 4 años porque no es capaz de escribir su nombre y ha leído por internet que puede tratarse de una disgrafía. Usted le transmite que el diagnóstico de trastorno de la expresión escrita debe realizarse, por norma general, al menos con:
 - a. 5 años
 - b. 6 años
 - c. 8 años
 - d. 10 años

2. ¿En qué zona se encuentran los núcleos de la mayor parte de las neuronas serotoninérgicas del cerebro?
 - a. Núcleos del rafe
 - b. Sustancia negra y área tegmental ventral
 - c. Locus ceruleus
 - d. Núcleo tuberomamilar

3. Se presenta en su consulta una mujer de 39 años con deterioro progresivo de funciones cognitivas en los últimos 10 años, junto con ánimo bajo, irritabilidad, aislamiento, agresividad y dificultad para cuidarse por sí misma. Presenta además muecas faciales que carecen de objetivo y marcha inestable. Durante una prueba de RMN se observa una atrofia del núcleo caudado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
 - a. Enfermedad de Parkinson
 - b. Enfermedad de Binswager
 - c. Enfermedad de Huntington
 - d. Enfermedad de Wilson

4. ¿Qué porcentaje de entre las demencias corresponde a la demencia vascular?
 - a. 10-15%
 - b. 15-30%
 - c. 40-50%
 - d. >50%

5. En un varón de 75 años que ha sufrido un cuadro de ictus hipóxico. ¿Qué ión estará aumentado en el interior de las neuronas dañadas durante este proceso?
 - a. Ca²⁺
 - b. Na⁺
 - c. K⁺
 - d. Cd

TEST
PSIQUIATRÍA

6. Paciente varón de 82 años ingresado a cargo de traumatología tras reemplazo de cadera izquierda. Enfermería solicita valoración por encontrarlo ansioso, levemente agitado, con un pensamiento incoherente e ideas delirantes. Lo primero a realizar en este paciente sería:
 - a. Pautar benzodiacepinas para disminuir la ansiedad
 - b. Solicitar analítica de sangre, de orina y placa de tórax
 - c. Realizar de manera urgente un tac craneal
 - d. No realizar de momento intervención médica dado que el cuadro puede remitir de manera espontánea

7. Uno de los siguientes síntomas no es habitual en la demencia por cuerpos de Lewy:
 - a. Alucinaciones visuales
 - b. Actividad física incesante en la fase de atonía muscular
 - c. Conducta estereotipada
 - d. Ideas delirantes

8. ¿Para qué es utilizado el cuestionario CAGE?
 - a. Valoración de consumo de cannabis
 - b. Para establecer la gravedad de la dependencia a alcohol
 - c. Para la detección de problemas de consumo de cocaína de forma rutinaria
 - d. Para la detección de problemas de consumo de alcohol de forma rutinaria

9. ¿Cuál es la tríada clásica de la encefalopatía de Wernicke?
 - a. Inquietud psicomotriz, diaforesis y taquicardia
 - b. Confusión, nistagmo y miosis
 - c. Oftalmoplejia, nistagmo y ataxia
 - d. Ataxia, ptosis palpebral y confusión

10. En relación a las intervenciones psicológicas en alcoholismo señale la incorrecta:
 - a. El entrenamiento en habilidades sociales es un procedimiento cognitivo-conductual de amplio espectro que cuenta con gran arraigo en el tratamiento del alcoholismo.
 - b. Las técnicas de autocontrol enseñan a las personas a reducir su consumo de alcohol y resulta más adecuado para aquellas personas con una dependencia más grave.
 - c. Las terapias cognitivas incluyen métodos que pretenden identificar y modificar pensamientos o creencias desadaptados y que contribuyen al problema del alcohol.
 - d. El abordaje de refuerzo comunitario es un enfoque terapéutico conductual, biopsicosocial, de amplio espectro centrado en el cambio de estilo de vida en personas que tienen un problema con el alcohol.

TEST
PSIQUIATRÍA

11. Juan Carlos es un chico de 35 años que el 11 de marzo de 2004 (11M) se encontraba esperando el tren para ir a la universidad en Atocha. En los atentados presentó múltiples quemaduras de segundo grado que preciaron curas durante varias semanas. En aquel momento Juan Carlos prefirió seguir haciendo su vida normal negándose a realizar seguimiento psicológico como alguno de sus amigos. Terminó dejando la carrera tras varios años suspendiendo. Soltero, vive con sus padres. Por las noches tiene pesadillas varias ocasiones al mes en que revive lo sucedido en el andén. Tampoco ha vuelto a coger ningún tren. Trabaja como reponedor en un supermercado. Sus padres están preocupados porque desde hace 5 años al llegar a casa del trabajo se encierra a beber un litro de cerveza en su habitación mientras juega con el ordenador. Luego cenando bebe otra cerveza con su padre. Saben que ve el televisor hasta altas horas de la madrugada en su habitación. Respecto a Juan Carlos señale la opción más correcta:
- a. Antes de hacer ningún tipo de abordaje psicoterapéutico Juan Carlos debería dejar de beber.
 - b. El trastorno de estrés postraumático aumenta la posibilidad de abuso de sustancias como una forma de automedicar aquellos síntomas como la ansiedad, la hipervigilancia o los pensamientos intrusivos y aliviar la sensación de frialdad afectiva y evitación social.
 - c. El consumo de alcohol provoca una hiperactivación de los sistemas de neurotransmisión serotoninérgico.
 - d. La ansiedad no se ve influenciada por el consumo de alcohol.
12. Varón de 25 años con diagnóstico de esquizofrenia paranoide ingresado desde hace 13 días en la unidad de hospitalización breve. Éste es su quinto ingreso desde los 18 años en que se le diagnosticó la enfermedad junto a un consumo perjudicial de cannabis. Al principio los ingresos eran motivados por abandono de tratamiento. En este último el paciente asegura haber tomado el tratamiento y su familia así lo corrobora. Actualmente fuma 6 porros al día, refiere que no lo puede dejar, que es lo único que le calma, más que las pastillas. Su hermano mayor también fue diagnosticado de Esquizofrenia y consumo de cannabis ocasional a los 19 años. Abandonó el consumo de cannabis y ha recibido tratamiento con antipsicóticos oral. No precisó más ingresos y ha conseguido finalizar el grado de empresariales. Señale la respuesta verdadera:
- a. En nuestro paciente es imprescindible una medicación inyectable.
 - b. El pronóstico del paciente es similar al de su hermano.
 - c. En este paciente es importante optimizar de forma individualizada el tratamiento abordando de forma concomitante el consumo de cannabis, así como los síntomas psicóticos.
 - d. Es poco probable que el paciente reingrese de nuevo.
13. En los pacientes dependientes de alcohol que realizan tentativas de suicidio se han relacionado los siguientes factores de riesgo excepto uno:
- a. Los episodios de intoxicaciones
 - b. Los síntomas depresivos
 - c. Rasgos de personalidad tipo obsesivo
 - d. El aislamiento social

TEST
PSIQUIATRÍA

14. Adolescente varón de 16 años que acude a consultas externas acompañado por su madre. La demanda principal de la madre (el paciente no cree que hiciera falta venir) es que su hijo desde hace dos meses presenta, fundamentalmente por la noche, episodios de irritabilidad alternados con llanto con sensación de muerte inminente, sudoración y taquicardias. El paciente lo atribuye a que el bachillerato le está costando mucho sacárselo y su madre es la que refiere que ha encontrado marihuana en la habitación de su hijo. El paciente termina reconociendo un consumo diario de 1-2 porros en el instituto y otro antes de subir a casa a cenar. Reconoce que ha intentado reducir este consumo, pero sabe que le tranquiliza. En cuanto a la patología dual del adolescente selecciones la respuesta falsa:
- El abordaje secuencial aporta más beneficios que el abordaje bimodal
 - En los adolescentes con patología dual es más frecuente que el abuso o dependencia no se limite a una sustancia, sino que haya una historia de policonsumo
 - La intervención de la familia constituye un pilar muy importante en el tratamiento
 - La intervención deberá ser considerada desde diferentes estrategias (médicas, psicofarmacológicas, psicoterapéuticas, psicosociales) y en diferentes formatos (individual, grupal, familiar, comunitario)
15. ¿Qué parte del cerebro está directamente implicada en el comportamiento sexual en mamíferos?
- Lóbulo temporal
 - Sistema límbico
 - Neocórtex
 - Lóbulo parietal
16. Respecto al tratamiento de los Trastornos de Ansiedad en la Infancia y Adolescencia, señale la respuesta ERRÓNEA:
- Los ISRS son el tratamiento farmacológico más aceptado
 - Las benzodiacepinas han demostrado su eficacia en estudios sistematizados para su uso en los trastornos de ansiedad de niños y adolescentes
 - El tratamiento de elección es la psicoterapia cognitivo-conductual
 - El tratamiento farmacológico debe plantearse para los trastornos de ansiedad de intensidad moderada-grave o cuando ha fracasado la psicoterapia
17. ¿Cuál de los siguientes tratamientos farmacológicos no están indicados en un adolescente con trastorno bipolar?
- Metilfenidato
 - Olanzapina
 - Carbonato de Litio
 - Lamotrigina
18. ¿Qué factor no pronostica una buena respuesta al TEC:
- Endogenicidad del cuadro
 - Presencia de síntomas psicóticos
 - Catatonía
 - Menor edad

TEST
PSIQUIATRÍA

- 19.Cuál de las siguientes características se asocia a la técnica de TEC de aplicación unilateral:
- Produce menos amnesia
 - Se utiliza corriente de mayor voltaje
 - Rápida mejoría sintomática tras su aplicación
 - Es efectiva en la esquizofrenia
20. Señalar la respuesta correcta respecto a los tratamientos biológicos:
- La psicocirugía puede ser de primera elección e cuadros depresivos, ansiedad crónica, estados de agresividad irreductible y cuadros psicóticos graves, siendo esta última su principal indicación
 - La estimulación magnética transcraneal no es tratamiento de elección dado que no se encuentra suficiente evidencia sobre sus beneficios y por el riesgo y efectos secundarios que conlleva
 - La estimulación cerebral profunda se utiliza en trastorno obsesivo compulsivo y trastorno depresivo. Permite una localización más precisa de la estimulación respecto a otras técnicas y tiene como ventaja la reversibilidad del proceso
 - La fototerapia tiene como principal indicación los trastornos depresivos recurrentes, no tiene contraindicaciones absolutas y sus efectos secundarios son leves
21. Está considerado iniciar un tratamiento antidepresivo para un paciente polimedcado y quiere evitar en la medida de lo posible un fármaco que induzca o inhiba al citocromo p450. ¿Cuál de los siguientes utilizaría?
- Citalopram
 - Fluoxetina
 - Fluvoxamina
 - Mirtazapina
22. Varón de 32 años diagnosticado de trastorno bipolar con un último episodio mixto. Ha tenido síntomas de difícil control a lo largo de los últimos 18 meses y se le ha tratado con farmacopea diversa. En la revisión rutinaria expresa estabilidad anímica en los últimos tres meses. Sin embargo, aqueja temblor de predominio distal en las manos. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el que está más probablemente implicado en su temblor?
- Carbamazepina
 - Gabapentina
 - Lamotrigina
 - Carbonato de Litio
23. ¿Por qué mecanismo puede la pregabalina aliviar el dolor?
- Unión a canales iónicos de sodio cerrados
 - Unión a canales iónicos de sodio abiertos
 - Unión a canales iónicos de calcio cerrados
 - Unión a canales iónicos de calcio abiertos
24. ¿Cuál de las siguientes propiedades de la memantina es útil para el tratamiento de la enfermedad de Alzheimer?
- Antagonismo serotoninérgico 5HT3
 - Antagonismo sigma
 - Antagonismo NMDA en el sitio del PCP
 - Antagonismo NMDA en el sitio del magnesio

TEST
PSIQUIATRÍA

25. El trastorno facticio se caracteriza por:
- Un buen pronóstico
 - Una producción inconsciente de síntomas
 - La alta de incentivos externos para la conducta
 - La involuntariedad en la producción de los síntomas
26. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en relación con las convulsiones no epilépticas:
- Se caracterizan por un inicio y patrón de gran variabilidad
 - Suelen presentarse con movimientos clónico tónicos de las extremidades
 - Ocurren con más frecuencia de día
 - Entre el 25 y el 50% de los pacientes diagnosticados de Trastorno de conversión recibirán posteriormente un diagnóstico de enfermedad médica que explica la presencia de los síntomas.
27. El concepto de “autismo mental” susceptible de dissociarse en situaciones traumáticas se los debemos a:
- Charcot
 - Freud
 - Janet
 - Babinski
- 28.Cuál de las siguientes constituye la comorbilidad más frecuente en personas con Trastorno de identidad disociativa:
- Trastorno depresivo
 - Trastorno por abuso de sustancias
 - Crisis parciales complejas
 - Trastorno Límite de la Personalidad
29. ¿Cuál de los siguientes trastornos de la personalidad forma parte del grupo del clúster C de los trastornos de la personalidad según el DSM5?
- Trastorno paranoide de la personalidad
 - Trastorno de la personalidad por dependencia
 - Trastorno histriónico de la personalidad
 - Trastorno límite de la personalidad
30. Según el DSM5, el trastorno límite de la personalidad se caracteriza por los siguientes criterios EXCEPTUANDO:
- Ideación paranoide transitoria relacionada con el estrés
 - Impulsividad
 - Inestabilidad afectiva
 - Distanciamiento de las relaciones sociales

TEST
PSIQUIATRÍA

31. La teoría que se basa fundamentalmente en la dualidad entre intraversión y extraversión fue propuesta por:
- Robert Cloninger
 - Hans Eysenck
 - Raymond Cattell
 - Emil Kraepelin
32. ¿Cuál de los siguientes NO forma parte de los 4 factores de la personalidad de la Teoría de Gray?
- búsqueda de sensaciones
 - extraversión
 - ansiedad
 - Impulsividad
33. ¿Cuál de los siguientes dominios expuestos se incluye en el modelo de personalidad de cinco factores (“big five”) ?:
- Neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y responsabilidad
 - Neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia, amabilidad y evitación del dolor
 - Apertura a la experiencia, amabilidad, responsabilidad, evitación del dolor y búsqueda de novedades.
 - Amabilidad, neuroticismo, extraversión, apertura a la experiencia y persistencia
34. El modelo de la personalidad de Cloninger y colaboradores incluye los siguientes temperamentos, EXCEPTUANDO:
- Evitación del dolor
 - Búsqueda de novedades
 - Dependencia de la recompensa
 - Apertura a la experiencia
35. Las siguientes manifestaciones corresponden al trastorno narcisista de la personalidad, EXCEPTUANDO:
- A menudo puede producirse depresión después de un episodio de rechazo, derrota o crítica
 - Los pacientes son distantes en las relaciones personales e intentan mantener una imagen de autosuficiencia
 - Los pacientes tienden a explotar a otras personas para conseguir sus objetivos “especiales”
 - La terapia cognitivo-conductual es preferible a la psicoterapia de tipo psicodinámico

TEST
PSIQUIATRÍA

36. Las siguientes afirmaciones relativas al trastorno de la personalidad por evitación son ciertas, EXCEPTUANDO:
- Su presentación deber ser diferenciada del trastorno esquizoide de la personalidad
 - Los pacientes se muestran cohibidos en las relaciones personales íntimas
 - Se recomienda la administración de inhibidores de la receptación de serotonina
 - Los pacientes se interesan pronto en el tratamiento
37. ¿Qué es lo que NO hay que hacer cuando se evalúa la conducta suicida?:
- Se ha intentar minimizar el acto suicida
 - Hay que buscar la ayuda del entorno (personas cercanas)
 - Evaluación psicopatológica
 - Determinar la intencionalidad
38. Los siguientes factores se asocian a un mayor riesgo de suicidio consumado, excepto:
- No tener tentativas previas
 - Grado de letalidad
 - Nota de despedida
 - Sexo masculino
39. Respecto a la incidencia de suicidio consumado entre hombres y mujeres con esquizofrenia, se puede afirmar que:
- es mayor en mujeres que en hombres
 - es mayor en hombres que en mujeres
 - la probabilidad es del 25%
 - es menor que el de la población general
40. ¿Cómo se define la conducta parasuicida?
- acto con un fin mortal, que se hace deliberadamente y se realiza con conocimiento o esperanza de la muerte
 - acto no habitual con un fin no mortal, que se realiza de forma deliberada
 - acto no habitual, con fin no mortal que hace la persona suicida con un fin no mortal
 - acto cercano al suicidio, pero sin consumación del acto
41. La tasa de concordancia para la esquizofrenia entre gemelos monoigóticos es aproximadamente:
- 5%
 - 10%
 - 20%
 - 50%

TEST
PSIQUIATRÍA

42. De los siguientes datos epidemiológicos en relación a la esquizofrenia uno es falso:
- La prevalencia-vida es del 0.7%-1% aproximadamente
 - En varones se describe un comienzo más precoz
 - Hay una mayor incidencia en clases sociales bajas
 - La edad de inicio suele ser entre los 18-25 en varones
43. Según estudios neurocognitivos y de neuroimagen funcional, ¿Qué circuito parece estar afectado ante la presencia de los síntomas deficitarios del Trastorno Esquizofrénico?
- circuito tubero-infundibular
 - circuito dorsolateral-prefrontal-tálamocortical
 - circuito dorsolateral-prefrontal-ganglios basales-tálamocortical
 - circuito prefrontal-ganglios basales-tálamocortical
44. ¿Cuáles de los siguientes hallazgos apuntan a un neurodesarrollo prenatal anormal en personas con esquizofrenia?
- mayor tamaño del perímetro craneal
 - presencia de alteraciones en los dermatoglifos palmares
 - espina bífida
 - simetría hemisférica cerebral
45. La hipótesis del neurodesarrollo de la esquizofrenia:
- Es una hipótesis que hace referencia al trastorno esquizofrénico de debut precoz
 - Los hallazgos de neuroimagen muestran una dilatación ventricular y una hiperfrontalidad cognitivo-dependiente
 - Es una hipótesis integradora de los hallazgos clínicos, neurobiológicos, neuropatológicos, de neuroimagen, epidemiológica y genéticos.
 - Hace referencia a complicaciones obstétricas y perinatales, así como hallazgos neurobiológicos basados en el efecto psicoticomimético de los agonistas dopaminérgicos (anfetaminas, cocaína, etc).
46. En la hipótesis glutamatérgica de la esquizofrenia, el glutamato provocaría los síntomas psicóticos actuando sobre otro neurotransmisor. Señálalo de entre los siguientes:
- Noradrenalina
 - Serotonina
 - Ácido gamma-aminobutírico (GABA)
 - Dopamina
47. ¿Qué alteración explicaría los síntomas negativos en la esquizofrenia según la hipótesis dopaminérgica?
- Una hiperactividad dopaminérgica en el sistema tubero-infundibular
 - Una hiperactividad dopaminérgica en el sistema límbico
 - Una hiperactividad dopaminérgica en el lóbulo prefrontal
 - Una hipoactividad dopaminérgica en el lóbulo prefrontal

TEST
PSIQUIATRÍA

48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa en relación al trastorno obsesivo compulsivo en la infancia?
- a. Los niños tienden a empezar antes el trastorno que las niñas.
 - b. Es muy raro que los niños cambien las obsesiones o compulsiones a lo largo del tiempo.
 - c. Es frecuente que los niños con trastorno obsesivo compulsivo preserven el funcionamiento académico.
 - d. Algunos casos de trastorno obsesivo compulsivo pueden ser debidos a una reacción autoinmune
49. ¿Cuál de estas escalas no es útil para valorar sintomatología en la esquizofrenia?
- a. PANSS
 - b. SAPS
 - c. STAI
 - d. BPRS
50. ¿Cuál de los siguientes síntomas no es válido para el diagnóstico de esquizofrenia?
- a. Ataques de pánico
 - b. Delirios sistematizados
 - c. Aislamiento social
 - d. Alucinaciones auditivas
51. La característica diferenciadora básica de un trastorno esquizoafectivo sería:
- a. Un gran deterioro en el nivel de funcionamiento
 - b. Presencia de síntomas delirantes y alucinatorios de tipo incongruente con el estado de ánimo
 - c. La presencia durante al menos dos semanas de ideas delirantes o alucinatorias en ausencia de una sintomatología afectiva relevante
 - d. La ausencia de alucinaciones
52. El trastorno esquizofreniforme difiere de la esquizofrenia solamente por:
- a. La persistencia de síntomas psicóticos con síntomas afectivos
 - b. Tener una duración más breve
 - c. No requiere tratamiento psicofarmacológico
 - d. Tener una trama delirante sistematizada
53. ¿Los factores que se enumeran a continuación se han asociado a un buen pronóstico del trastorno esquizofrénico, EXCEPTUANDO?:
- a. La alta expresividad emocional de la familia
 - b. Buen insight premórbido
 - c. Existencia de una situación desencadenante
 - d. Comienzo tardío

TEST
PSIQUIATRÍA

54. La 5ª versión de la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) considera trastornos de ansiedad todos los siguientes excepto:
- Fobias
 - Trastorno de personalidad dependiente
 - Trastorno de angustia
 - Mutismo selectivo
55. La reacción aprendida ante un acontecimiento que se prevé se denomina:
- ansiedad de anticipación
 - ansiedad flotante
 - crisis de pánico
 - condicionamiento
56. ¿Cuál de las siguientes definiciones NO es correcta?:
- Trastorno por ansiedad fóbica: Ansiedad en ciertas situaciones bien definidas o frente a estímulos externos que no son en sí mismos generalmente peligrosos.
 - Trastorno de angustia: ansiedad de aparición súbita y rápida y a menudo inesperada
 - Trastorno por ansiedad social: miedo a ser enjuiciado por los otros en el contexto de un grupo
 - Agorafobia: ansiedad por miedo a tener una crisis de angustia
57. La reacción ansiosa mantenida por un estímulo de origen no identificable y que puede condicionar la conducta y el pensamiento se denomina:
- ansiedad de anticipación
 - ansiedad flotante
 - crisis de ansiedad
 - rumiación
58. La 5ª versión de la clasificación del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5) considera trastornos de ansiedad todos los siguientes excepto:
- Fobias
 - Trastorno de angustia
 - Mutismo selectivo
 - Trastorno obsesivo-compulsivo
59. ¿Cuál de las siguientes definiciones NO es correcta?
- Trastorno por ansiedad fóbica: Ansiedad en ciertas situaciones bien definidas o frente a estímulos externos que no son en sí mismos generalmente peligrosos.
 - Trastorno por ansiedad social: miedo a las aglomeraciones de personas
 - Agorafobia: ansiedad en lugares o situaciones donde escapar puede resultar difícil
 - Trastorno de ansiedad por separación: ansiedad excesiva concerniente a la separación del individuo de aquellas personas por las que siente apego

TEST
PSIQUIATRÍA

60. El tratamiento farmacológico de elección del trastorno de angustia es:
- Alprazolam
 - Antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina
 - Pregabalina
 - Antidepresivos inhibidores de la recaptación de noradrenalina
61. La mayoría de trastornos de ansiedad son más frecuentes en mujeres que en hombres excepto:
- Fobia social
 - Trastorno de ansiedad generalizada
 - Trastorno de pánico
 - Agorafobia
62. El Síndrome de Cotard hace referencia a:
- La idea delirante de que otras personas han sido reemplazadas por dobles exactos
 - La idea delirante de haber perdido sus intestinos y corazón
 - La idea delirante de que otra persona, en general de un estatus superior, está enamorada del sujeto.
 - La idea delirante de que el compañero sexual es infiel.
63. En comparación con la depresión unipolar, la depresión bipolar:
- Tiene una aparición posterior
 - Tiene una aparición más gradual
 - Conlleva un riesgo mayor de suicidio
 - Viene acompañada con menos frecuencia por síntomas psicóticos en pacientes jóvenes
64. Los siguientes síntomas atípicos son comunes entre los pacientes con trastorno bipolar que experimentan un episodio de depresión; todos ellos pueden aplicarse al trastorno bipolar, EXCEPTO:
- Hipersomnia
 - Anergia
 - Ansia por comer carbohidratos
 - Reactividad del estado de ánimo
65. La razón básica por la que las pruebas complementarias no se utilizan para el diagnóstico de depresión es que:
- Son muy costosas
 - No pueden superar al “patrón de oro”, que es la entrevista clínica.
 - No están disponibles en todos los hospitales y laboratorios.
 - Tienen demasiada especificidad

TEST
PSIQUIATRÍA

66. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los marcadores diagnósticos del trastorno depresivo mayor (TDM) es verdadera?:
- No existe ninguna prueba de laboratorio que haya demostrado suficiente sensibilidad y especificidad como herramienta diagnóstica para el TDM.
 - Se dispone de diversas pruebas de laboratorio, pero no hay ninguna empresa que los ofrezca al público.
 - Se han retirado las pruebas de laboratorio por temor a que las personas que resulten positivas para TDM puedan cometer suicidio.
 - Las pruebas que existen son válidas desde el punto de vista diagnóstico, pero no están cubiertas por las compañías de seguros.
67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre las diferencias entre sexos en el riesgo de suicidio y en las tasas de suicidio en el trastorno depresivo mayor es verdadera?:
- El riesgo de intentos de suicidio y de suicidio consumado es mayor en mujeres.
 - El riesgo de intentos de suicidio y de suicidio consumado es igual en hombres y en mujeres.
 - La disparidad en las tasas de suicidio por sexos es mucho mayor en sujetos con TDM que en la población general.
 - El riesgo de intentos de suicidio es mayor en mujeres, aunque es menor el riesgo de suicidio consumado.
68. Una mujer de 45 años se presenta en una clínica externa para evaluación de la depresión. La mujer manifiesta estado de ánimo deprimido, desesperanza, alto grado de autocrítica e indecisión. El médico estima su gravedad como leve. Antes de que comenzara el episodio de depresión, la mujer había estado cavilando sobre la posibilidad de “un fracaso” relacionado con su hogar o trabajo. ¿Qué tratamiento ayudaría mejor a esta paciente a combatir sus síntomas en general y su sensación de que ella es un “fracaso” en particular?:
- Psicoterapia cognitivo-conductual
 - Psicoterapia de grupo
 - Psicoanálisis
 - Psicoterapia psicodinámica
69. En los estudios etiológicos del trastorno por déficit de atención:
- No se ha encontrado mayor concordancia en gemelos monocigóticos que dicigóticos
 - Con frecuencia aparecen signos neurológicos no focales
 - Existe una alteración receptorial del sistema serotoninérgico
 - Se han observado alteraciones en el lóbulo occipital
70. En los niños con autismo:
- Se observan alteraciones específicas en el EEG
 - No se han encontrado alteraciones estructurales cerebrales
 - Se observan más anomalías físicas congénitas leves que en sus hermanos sanos
 - La etiopatogenia se atribuye a microtraumatismos cerebrales.

TEST
PSIQUIATRÍA

PREGUNTAS DE RESERVA:

71. En el DSM-5 se incluyen dentro de los trastornos generalizados del desarrollo, todos excepto uno de los siguientes:
- Trastorno del espectro autista
 - Trastorno por déficit de atención e hiperactividad
 - Discapacidad intelectual
 - Trastorno negativista desafiante
72. En el diagnóstico diferencial entre autismo y trastorno mixto del lenguaje, habla a favor del segundo diagnóstico:
- Frases estereotipadas
 - Ausencia de problemas articulatorios
 - Rituales
 - Comunicación no verbal presente
73. El tratamiento de elección del trastorno bipolar en niños y adolescentes es:
- Carbamacepina
 - Ácido valproico
 - Antidepresivos
 - Carbonato de litio
74. ¿Cuál de las siguientes no forma parte de la tétrada de la narcolepsia?:
- Ataques de sueño durante el día
 - Epilepsia
 - Parálisis del sueño
 - Alucinaciones hipnagónicas
75. La enuresis:
- Se diagnostica en niños mayores de 2 años
 - Puede acompañarse de madurez neuromotora de la vejiga
 - Es equivalente a una depresión enmascarada
 - Sólo es nocturna