

RABIA




ETIOLOGÍA

Enfermedad vírica causada por un virus del género *Lyssavirus* de la familia *Rhabdoviridae*.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

La mitad de la población mundial vive en zona endémica, siendo África y Asia los continentes con más del 95% de los casos mortales en el mundo, destacando las zonas rurales con falta de acceso a las campañas de información sanitaria y a los cuidados tras una mordedura.

En Europa, los principales reservorios son el zorro rojo, seguido por otros pequeños carnívoros salvajes como el perro mapache en Europa Central y el Báltico; y el murciélago en países como España.



SINTOMATOLOGÍA

El periodo de incubación suele ser de 2 a 3 meses, pudiendo oscilar hasta un año. Los primeros síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza y prurito en la zona de entrada del virus.

Cuando el virus se desplaza al sistema nervioso central comienzan los síntomas de confusión, agitación, hipersensibilidad a la luz y al sonido, delirio y parálisis progresiva que conduce a la muerte.

FORMA DE TRANSMISIÓN

Se produce, fundamentalmente, mediante la mordedura de un animal enfermo, o cuando su saliva se pone en contacto íntimo con heridas frescas y abiertas.



RECOMENDACIONES/CONSEJOS



- Evitar el contacto con animales salvajes o cuyo estatus sanitario sea desconocido.
- Tras una mordedura, lavar profundamente la herida durante unos minutos con abundante agua corriente y jabón.
- Acudir urgentemente a un centro de salud para valorar el tratamiento preventivo más adecuado tras la exposición: suero antirrábico y/o vacunas antirrábicas.

