

NOVEDADES en RECOMENDACIONES PREVENTIVAS PAPPS 2022.

Lunes, 8 de mayo de 2023





Previnfad

Grupo prevención en la infancia y la adolescencia



ELSEVIER


Atención Primaria

www.elsevier.es/ap



ARTICULO ESPECIAL

Resumen PAPPS Infancia y Adolescencia 2022[☆]



Olga Cortés Rico^{*}, M. Jesús Esparza Olcina, José Galbe Sánchez-Ventura, Ana Gallego Iborra, Carmen Rosa Pallás Alonso, Laura Garcia Soto, Álvaro Rando Diego, Julia Colomer Revuelta, Ana Garach Gómez, Leyre Martí Martí, José M. Mengual Gil v Grupo de la Infancia y Adolescencia del PAPPS

NOVEDADES en Recomendaciones Preventivas - PAPPS

2022

Proyectos

Nuevos

- Prevención del consumo de tabaco en la adolescencia
- Uso profiláctico de la vitamina k para la enfermedad hemorrágica del recién nacido

En Borrador

- Prevención del cáncer de piel y protección solar

Trabajando en :

- Vitamina D profiláctica
- Prevención de la obesidad
- Cribado de la criptorquidia
- Cribado de la presión arterial elevada en la infancia y adolescencia
- Prevención de la ferropenia

Prevención del consumo de tabaco en la adolescencia

Recomendaciones PrevInfad/PAPPS

Preguntar y aconsejar sobre CT* a padres y madres ** de forma oportunista y al menos una vez

Fuerte a favor se recomienda hacer

Preguntar y aconsejar a las embarazadas de forma oportunista y en las clases de preparación al parto

Fuerte a favor se recomienda hacer

Preguntar y aconsejar a adolescentes en la consulta de atención primaria frente al CT* de forma oportunista y al menos una vez

El grupo Previnfad no encuentra pruebas de calidad para recomendar el consejo breve frente al consumo de tabaco en adolescentes en atención primaria. No obstante dadas las importantes implicaciones que tiene para la salud , el desarrollo precoz de dependencia del tabaco y la mayor dificultad de abandono del CT cuando este se inicia a edades tempranas, **podría realizarse consejo o intervención breve en base a las preferencias y valores de los adolescentes y sus familias y de los recursos disponibles**

*CT: Consumo de tabaco ** Consejo a adultos

metodología GRADE

Uso profiláctico de la vitamina k para la enfermedad hemorrágica del recién nacido (EHRN)

Recomendaciones PrevInfad/PAPPS

- **Después del nacimiento se recomienda administrar a todos los recién nacidos 1 mg de vitamina K de forma profiláctica por vía intramuscular para prevenir la EHRN (fuerte a favor)**

Consideraciones especiales:

Con respecto a los niños prematuros:

Si el peso al nacimiento es menor de 1500 g: se sugiere administrar 0,5 mg en vez de 1 mg de vitamina K. Se administrará preferiblemente vía IM.

Se sugiere administrar la vitamina K vía intravenosa en recién nacidos graves (término y pretérmino), que corren riesgo de inestabilizarse por la administración intramuscular y para aquellos recién nacidos con enfermedad colestática conocida.

Si los padres rechazan la profilaxis intramuscular:

Se recomienda la siguiente pauta oral: Tres dosis de 2 mg de vitamina K oral (al nacimiento, entre el cuarto y el sexto día de vida, y entre las cuatro y seis semanas de vida).


metodología **GRADE**

NOVEDADES en Recomendaciones Preventivas - PAPPS

2022

Prevención del cáncer de piel y protección solar

Marco analítico



Adaptado con la autorización del US Preventive Services Task Force (USPSTF)

Prevención del cáncer de piel y protección solar

balance

- Los daños potenciales de dar el consejo en atención primaria para promover la disminución de la exposición al sol y el uso de protector solar, están poco estudiados, en los estudios que existen no se demuestran, sin embargo los efectos beneficiosos están mejor estudiados en trabajos de buena y moderada calidad que muestran buenos y moderados resultados, el balance entre los beneficios y los riesgos muestra un beneficio neto moderado

Prevención del cáncer de piel y protección solar !en borrador!

- Se sugiere dar consejo en la consulta de atención primaria, a los niños, adolescentes y sus familias, para promover la disminución de la exposición al sol y el uso de protector solar (débil a favor)
- Se recomienda al pediatra de atención primaria apoyar en el marco de la actividad comunitaria las intervenciones a nivel escolar (fuerte a favor)

metodología **GRADE**

Proyectos futuros

- Validación PHQ9 – cribado depresión mayor
- Consejos - promoción de la salud

Prevención Accidentes domésticos

Sueño

Promoción lectura

- Cribados

TCA

trastornos lenguaje

cardiopatías ductus dependiente



Gracias por su atención