

Informaciones de interés

NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2001 (Enero-Junio)

SUBGRUPO TERAPEUTICO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS
A02B2	Lansoprazol	OPIREN BAMALITE	- Prevención de la úlcera gástrica inducida por AINEs en pacientes de riesgo (con antecedentes de úlcera gástrica) que requieran un tratamiento crónico con AINEs. - Tratamiento del síndrome de Zollinger-Ellison.
	Rabeprazol	PARIET	- Combinación con regímenes terapéuticos antibacterianos adecuados para la erradicación del <i>Helicobacter pylori</i> en pacientes con úlcera péptica.
A08A	Grosello negro (hoja) (<i>Ribes nigrum</i> L.) Té verde (hoja) (<i>Camellia thea</i> Link.)	FITOSVELT (3)	- Tratamiento temporal complementario de las dietas de adelgazamiento en personas con ligero exceso de peso ligado, principalmente, a problemas de retención de líquidos.
B01A2	Tinzaparina sódica	INNOHEP	- Prevención de la coagulación en el sistema extracorpóreo en los circuitos de hemodiálisis, en pacientes sin riesgo hemorrágico conocido.
C01D2	Nitrendipino	NITRINA NITRENDIPINO BAYVIT TENSOGADAL	- Tratamiento de la hipertensión arterial y de la hipertensión arterial sistólica aislada del anciano.
C02E	Ramipril	ACOVIL	- Prevención del infarto de miocardio, ictus o muerte cardiovascular en pacientes con un elevado riesgo cardiovascular, tales como enfermedad cardíaca coronaria (con o sin historia clínica de infarto de miocardio), historia clínica de ictus o de enfermedad vascular periférica. - Prevención de la progresión a microalbuminuria (nefropatía incipiente) y hasta macroalbuminuria (nefropatía manifiesta) en pacientes con elevado riesgo cardiovascular.
	Zofenopril	ZOFENIL ZOPRANOL	- Infarto agudo de miocardio: está indicado para el tratamiento, iniciado dentro de las primeras 24 horas, de pacientes con infarto agudo de miocardio con o sin signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, hemodinámicamente estables, que no hayan recibido terapia con trombolíticos.
G03A3	Levonorgestrel	NORLEVO POSTFEMIN POSTINOR	- Anticonceptivo de emergencia dentro de las 72 horas siguientes a haber mantenido relaciones sexuales sin protección o al fallo de un método anticonceptivo.
G03G	Folitropina beta	PUREGON® (1)	- En el varón: Espermatogénesis deficiente debido a hipogonadismo hipogonadotrófico
H01A	Somatropina	GENOTONORM (1)	- Niños: Síndrome de Prader-Willi (SPW), para mejorar el crecimiento y la composición corporal. El diagnóstico del Síndrome de Prader-Willi deberá ser confirmado mediante prueba genética adecuada.
J01C4	Piperacilina Tazobactam	TAZOCEL (2)	- Tratamiento de infecciones intraabdominales, incluido apendicitis complicadas por ruptura o absceso, peritonitis e infecciones biliares, en niños hospitalizados con edad comprendida entre 2 y 12 años.
J05A	Ribavirina	REBETOL® (b) (1)	- Tratamiento de la hepatitis C en combinación con peginterferón alfa-2b.
L01D	Doxorubicina (liposomal)	CAELIX® (2)	- Cáncer de ovario avanzado en mujeres en las que ha fallado un régimen de quimioterapia de primera línea conteniendo platino.
L01E	Carboplatino	PLATINWAS (1)	- Carcinoma pulmonar de células pequeñas, en asociación con otros antineoplásicos. - Carcinoma epidermoide de cabeza y cuello avanzado, en régimen de poliquimioterapia. - Tratamiento neoadyuvante del carcinoma de vejiga invasivo (estadios B y C de Jewett) y de la enfermedad avanzada, formando parte de regímenes de poliquimioterapia.
	Verteporfin	VISUDYNE® (b) (1)	- Tratamiento de pacientes con neovascularización coroidea subfoveal secundaria a miopía patológica.
L02A	Letrozol	FEMARA	- Tratamiento de primera línea de cáncer de mama avanzado hormono-dependiente en mujeres postmenopáusicas.
	Leuprorelina	PROCRIN (c)	- Infertilidad femenina. Tratamiento complementario asociado a la administración de gonadotropinas exógenas, para la introducción de la ovulación en técnicas de reproducción asistida.
N03A	Gabapentina	NEURONTIN	- Dolor neuropático.

NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2001 (Enero-Junio) (Continuación)

SUBGRUPO TERAPEUTICO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	NUEVAS INDICACIONES AUTORIZADAS
N04A	Pergolida	PHARKEN	- Tratamiento de los signos y síntomas de la enfermedad de Parkinson en tratamiento inicial como monoterapia con el objeto de retrasar la introducción de levodopa.
N05A	Risperidona	RISPERDAL	- Está también indicado como medicación concomitante de los estabilizadores del estado del ánimo en el tratamiento de episodios maníacos asociados a trastornos bipolares.
N06A3	Venlafaxina	VANDRAL DOBUPAL RETARD	- Trastorno de ansiedad generalizada, que presenta una evolución de al menos 6 meses.
V02A	Micofenolato mofetilo	CELLCEPT® (a) Oral (1), parenteral (2)	- En combinación con ciclosporina y corticosteroides, está indicado para la profilaxis del rechazo agudo de trasplante en pacientes sometidos a trasplante alotéxico renal, cardíaco o hepático.
	Basiliximab	SIMULECT® (2)	- Profilaxis de rechazo agudo de órganos en trasplante renal alotéxico de novo en pacientes adultos y pediátricos. Debe utilizarse concomitantemente con inmunosupresión basada en ciclosporina para microemulsión y corticosteroides en pacientes con un panel de anticuerpos reactivos inferior al 80%, o en un régimen inmunosupresor triple de mantenimiento conteniendo ciclosporina para microemulsión, corticosteroides y azatioprina o micofenolato mofetilo.
	Inmunoglobulina de conejo antimocitos humanos	TIMOGLOBULINA (2)	- Tratamiento inmunosupresor de la anemia aplásica grave en pacientes no respondedores a tratamiento previo inmunosupresor con inmunoglobulina antimocítica equina.
V04A4	Galactosa Ac. Palmítico	LEVOGRAF LEVOVIST	- Ecocardiografía de contraste, modo B, incluyendo la obtención de imágenes con 2º armónico. - Diagnóstico del reflujo vesicoureteral (RVU) en niños mediante eco-cistografía con contraste.
	Gadopentetato de dimeglumina	MAGNEVIST MAGNOGRAF	- Ampliación de las indicaciones a niños menores de 2 años.
	Mangafodipir	TELASCAN®	- Como complemento de Imagen por Resonancia Magnética (IRM) para soporte del estudio de las lesiones pancreáticas focales.

Las especialidades con indicaciones autorizadas por procedimiento europeo centralizado llevan el superíndice © en el nombre de la marca comercial.

- (a) Esta indicación fue autorizada por la Comisión de las CCEE en noviembre de 2000.
- (b) En el Sistema Nacional de Salud esta especialidad farmacéutica es de dispensación en hospital y no lleva cupón-precinto.
- (c) Esta especialidad tiene cupón-precinto diferenciado, es necesaria la prescripción por especialista y el visado de inspección en el SNS para su dispensación.
- (1) Diagnóstico Hospitalario.
- (2) Uso Hospitalario.
- (3) Publicitaria.

CONSEJO DE REDACCION

PRESIDENTE: Sánchez Fierro, J.

Vocales: F. Amalich Fernández, V. Baos Vicente, J. Carramolino Hermosa, R. Pérez Maestu, E. Pérez Trallero, F. Plaza Piñol, C. Prieto Yerro, I. Prieto Yerro, J. L. Ruiz-Jiménez Aguilar, A. Sacristán Rodea, P. Sánchez García, J. M. Segovia de Arana.

Jefe de Redacción: M. Martínez de la Gándara.

Redacción y Secretaria de Redacción: M. T. Cuesta Terán.

Dirección: Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios.

Dirección Postal: Subdirección General de Asistencia y Prestación Farmacéutica. Ministerio de Sanidad y Consumo. Paseo del Prado, 18-20.28071 - Madrid

PRÓXIMO NÚMERO

Actualización en el abordaje y tratamiento de la osteoporosis en 2001.

Nuevos principios activos

Informaciones de interés.