

CUESTIONARIO: NOTIFICACIÓN DE UN INCIDENTE RELACIONADO CON LA TRANSFUSIÓN

Cuestionario: Reacción febril

Datos del paciente

Fecha de nacimiento: Sexo: Hombre ☐ Mujer ☐

Servicio hospitalario:

Antecedentes:

Transfusiones	Si ☐	No ☐	Desc. ☐
Cirugía	Si ☐	No ☐	Desc. ☐
Embarazos	Si ☐	No ☐	Desc. ☐
Inmunodepresión	Si ☐	No ☐	Desc. ☐
Reacción transfusional previa	Si ☐	No ☐	Desc. ☐

Tipo de reacción:

Datos del componente

Tipo: Hematíes ☐

Indicaciones

Anemia aguda por hemorragia	☐
Anemia aguda por otras causas	☐
Anemia crónica	☐
Anemia perioperatoria	☐
Anemia y cardiopatía	☐
Anemia hemolítica autoinmune	☐
Anemia hemolítica congénita	☐
Anemia hemolítica otras causas	☐
Anemia del prematuro	☐
Otras causas	☐

Características

Sangre total	☐	Irradiado	☐
Leucorreducidos	☐	Lavado	☐
Exanguinotransfusión	☐	Eritroaféresis	☐
Uso neonatal	☐	Transfusión intrauterina	☐

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de extracción:

Plaquetas ☐*Indicaciones*

Trombocitopenia. Profilaxis de sangrado	☐
Trombocitopenia. Hemorragia	☐
Trombocitopenia. Profilaxis procedimiento invasivo	☐
Disfunción plaquetaria congénita. Profilaxis de sangrado	☐
Disfunción plaquetaria congénita. Hemorragia	☐
Disfunción plaquetaria congénita. Profilaxis procedimiento invasivo	☐
Disfunción plaquetaria adquirida. Profilaxis de sangrado	☐
Disfunción plaquetaria adquirida. Hemorragia	☐
Disfunción plaquetaria adquirida. Profilaxis procedimiento invasivo	☐

Características

Irradiado	☐	Leucorreducido	☐
Pool	☐	Tromboaféresis	☐
HLA compatibles	☐	HPA compatibles	☐
Uso neonatal	☐	Inactivados	☐

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Plasma ☐*Indicaciones*

Hemorragia aguda con coagulopatía por consumo	☐
Hemorragia aguda con coagulopatía por anticoagulante	☐
Hemorragia aguda con coagulopatía por enfermedad hepática	☐
Hemorragia aguda con coagulopatía de otras causas	☐
Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía hepática	☐
Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía por anticoagulantes	☐
Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía por enfermedad hepática	☐
Profilaxis procedimiento invasivo en coagulopatía de otras causas	☐
Coagulación intravascular diseminada	☐
Recambio plasmático terapéutico	☐
Deficiencia aislada de factor de la coagulación	☐
Otros motivos	☐

Características

Azul metileno ☐ Cuarentenado ☐

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Granulocitos ☐

Indicaciones

Neutropenia asociada a infección ☐

Disfunción de los neutrófilos asociada a infección ☐

Otras ☐

Características

Buffy ☐ Leucorreducido ☐

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Otros ☐

Identificación

Nº de unidad: Volumen transfundido (ml): Fecha de la extracción:

Procedencia de la donación: Alogénica ☐ Autóloga ☐

Datos de la Transfusión

Fecha de la Transfusión: Hora Transfusión:

Prioridad

Rutina ☐ Emergencia ☐ Desconocida ☐

Localización

Urgencias ☐ Planta ☐ Quirófano ☐ UVI ☐

Hospital de día ☐ Hospitalización a domicilio ☐ Otros ☐

Servicio solicitante

Cardiología ☐	Cirugía Gral. y Digestiva ☐	Digestivo ☐
Ginecología-Obstetricia ☐	Hematología Clínica ☐	Medicina Intensiva ☐
Medicina Interna ☐	Nefrología ☐	Oncología Médica ☐
Pediatría ☐	Traumatología y C. Ortopédica ☐	Urgencias ☐
Urología ☐	Otros ☐	

Momento del incidente

Durante la transfusión ☐

Después de la transfusión ☐ Especificar tiempo Minutos ☐ Horas ☐ Días ☐ Meses ☐

Datos del paciente

Antecedentes

Premedicación

☐ Sí ☐ No

Especificar

Reacciones previas

☐ Sí ☐ No

Especificar

Datos Clínicos

Fiebre ☐

Cianosis ☐

Disnea ☐

Escalofríos ☐

Hipotensión ☐

Náuseas/Vómitos ☐

Tiritona ☐

Crisis Hipertensiva ☐

Otros ☐

Estudio de la reacción

Anti-HLA

☐ Sí ☐ No

Especificar

Antic.Anti-Granulocitos

☐ Sí ☐ No

Especificar

Antic.Anti-Plaquetarios

☐ Sí ☐ No

Especificar

Cuantificación de la gravedad

Signos inmediatos sin riesgo vital y resolución completa	1	☐
Signos inmediatos con riesgo	2	☐
Morbilidad a largo plazo	3	☐
Muerte del paciente	4	☐

Imputabilidad

No relación (aparentemente asociado a transfusión, con evidencia de que el componente no es la causa)	0	☐
Posible (pudiera estar relacionado o no a una causa no transfusional)	1	☐
Sugestivo (efecto compatible con la transfusión y no explicable por otras)	2	☐
Seguro (demostrada su relación con la transfusión)	3	☐

CONFIDENCIAL