

Principales cambios en las Actualizaciones de la Estrategia de Vacunación frente a COVID-19 en España

Documento	Fecha publicación	Detalles de los cambios principales
Actualización 1	18/12/2020	<p>Vacunas: Actualización de las publicaciones sobre las vacunas en desarrollo y en fase de autorización</p> <p>Priorización de la vacunación: Definición de los cuatro grupos de población incluidos en la primera etapa de vacunación en el siguiente orden: grupos 1, 2, 3 y 4</p> <p>Población con antecedente de infección por SARS-CoV-2: Se recomienda la vacunación en los grupos 1, 2 y 3</p> <p>Modelo de hoja Informativa sobre la vacunación frente a COVID-19 y consentimiento informado por representación para la vacunación frente a COVID-19</p>
Actualización 2	21/01/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Información sobre autorización de comercialización e inicio de vacunación con Comirnaty (BioNTech/Pfizer) el 27 de diciembre. - Información sobre autorización de comercialización de la vacuna Spikevax (Moderna) y fecha prevista de disponibilidad de dosis - Información sobre las futuras vacunas que evaluará la EMA (Vaxzevria de AstraZeneca) - Pauta de vacunación con vacunas de ARNm - Actualización de las publicaciones de vacunas. <p>Priorización de la vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aclaraciones sobre personal incluido en los grupos 2 y 3. Extensión de la definición del grupo 3 - Definición siguiente grupo a vacunar (Grupo 5) <p>Justificación ética de la priorización realizada</p>
Actualización 3	09/02/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Información sobre autorización de comercialización de vacuna Vaxzevria (AstraZeneca) - Características de Vaxzevria - Utilización de las vacunas según grupos definidos - Eficacia de las vacunas autorizadas frente a las nuevas variantes de SARS-CoV-2 <p>Priorización de la vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grupo 3 pasa a ser grupo 3A y se crea y define grupo 3B (Otros profesionales sanitarios y sociosanitarios). - Definición grupo 6 subdividido en: 6A, 6B y 6C <p>Vacunación de personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2: Nuevas recomendaciones para los grupos 2, 3 y 6: Personal ≤55 años sin condiciones de riesgo que ha padecido la infección se pospone la vacunación 6 meses desde el diagnóstico. Si este personal ≤55 años sin</p>

		<p>condiciones de riesgo padece la infección tras la primera dosis se administrará la segunda dosis 6 meses después de haber padecido la infección.</p> <p>Personal >55 años se actuará igual que las que no tienen antecedente de infección</p> <p>Justificación ética de la priorización realizada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - principios y valores que rigen el acceso a cada tipo de vacuna por los diferentes grupos de población
Actualización 4	26/02/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Información sobre autorización de comercialización de la vacuna Vaxzevria (AstraZeneca) - Revisión de evidencia científica sobre las tres vacunas autorizadas (efectividad de la vacunación) - Datos de vacunación en España <p>Priorización de la vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Recapitulación de los primeros grupos de población priorizados: grupos 1 a 4 - Definición de los grupos 7, 8 y 9 - Nuevos grupos a vacunar: 3A, 3B, 3C, 4, 5, 6A, 6B, 6C, 7, 8 y 9 - Establecimiento del orden de los grupos de población a vacunar por tipo de vacuna <p>Vacunación de personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2: Se mantienen las recomendaciones en las personas ≤55 años que han padecido la infección se administrará una única dosis 6 meses después de pasar la enfermedad. Si se padece la infección entre la primera y segunda dosis también se administrará la segunda dosis 6 meses después de la infección</p>
Actualización 5	30/03/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorización de comercialización de la vacuna de Janssen todavía no disponible: Características y su utilización - Cambios en las recomendaciones de vacunación con Vaxzevria por acontecimientos adversos: Ampliación del uso a personas >55 años - Mensajes fundamentales para transmitir a la población <p>Priorización de la vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reestructuran los grupos 5C, 7 y 8 - Definición de las condiciones de riesgo incluidas en el grupo 7 <p>Vacunación de personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2: Se modifica la edad de corte en la que se recomienda la administración de una única dosis, de los ≤55 años a los ≤65 años</p>
Actualización 6	20/04/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaxzevria (AstraZeneca): Síndrome trombosis con trombocitopenia (STT). Revisión de los mensajes a transmitir a la población - Restricción de uso de Vaxzevria en personas <60 años. Se pospone la administración de la segunda dosis en los menores de 60 años que han recibido la primera dosis de esta vacuna <p>Priorización de la vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reestructuración de los grupos 5C, 7 y 8

		<ul style="list-style-type: none"> - Uso de Vaxzevria en personas de 60-65 años de edad <p>Vacunación de personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2: Aclaraciones de las recomendaciones de la Actualización 5</p>
Actualización 7	11/05/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaxzevria (AstraZeneca): Actualización STT. Ampliación del intervalo de administración de la segunda dosis a 16 semanas en las personas <60 años que hayan recibido una primera dosis de esta vacuna - Janssen: Actualización acontecimientos adversos notificados en EE.UU. Utilización de esta vacuna - Se presenta nueva evidencia <p>Priorización de la vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización grupos 7, 8 y 9 - Se añade grupo 10 (personas entre 40 y 49 años de edad) <p>Vacunación en embarazadas y lactantes: Recomendación de vacunar con vacunas de ARNm cuando les corresponda según el grupo de priorización al que pertenezcan</p> <p>Vacunación en adolescentes y pre-adolescentes: Indicación de uso de Comirnaty en el grupo de edad entre 12-15 años bajo evaluación de las autoridades reguladoras de medicamentos. Se proponen grupos de priorización para este grupo de edad</p>
Nota a Actualización 7 y Consentimiento Informado	21/05/2021	<p>Se recomienda administrar Comirnaty como segunda dosis en personas <60 años que recibieron la primera dosis de Vaxzevria y están pendientes de completar la pauta de vacunación (pauta heteróloga). El intervalo entre dosis será de 12 semanas.</p> <p>Las personas que rechacen la vacunación con Comirnaty, pueden recibir como segunda dosis Vaxzevria previo consentimiento informado.</p>
Informe Comité de Bioética de España	21/05/2021	<p>Fundamentos ético-legales de permitir a las personas <60 años que recibieron una primera dosis de Vaxzevria, vacunarse con la misma vacuna como segunda dosis</p>
Actualización 8	22/06/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vaxzevria: Actualización evidencia científica sobre pauta heteróloga en personas <60 años. Recomendación segunda dosis con Vaxzevria (pauta homóloga) en personas 60-69 años Contraindicación de la vacuna en personas con eventos trombóticos con trombocitopenia tras primera dosis - Janssen: Actualización de nuevos grupos a vacunar con esta vacuna (personas de 40 y más años de edad) - Se contraindican las vacunas de vectores víricos a personas con antecedente de fuga capilar sistémico. Se desaconseja su administración a personas con antecedente de trombocitopenia inducida por heparina <p>Priorización de la vacunación:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de los grupos 7, 8 y 9 - Inclusión de los grupos 11, 12 y 13 <p>Vacunación en embarazadas, puerperio y lactantes:</p>

		<p>Nueva evidencia</p> <p>Vacunación de adolescentes y preadolescentes: Extensión de la autorización de comercialización de Comirnaty a personas a partir de 12 años de edad</p> <p>Vacunación en personas con COVID persistente: Revisión evidencia científica y recomendaciones</p> <p>Vacunación en personas que han recibido una dosis fuera de la UE: Vacuna y pauta a administrar en personas que han recibido una dosis de vacunas no autorizadas por la UE en el extranjero para completar pauta de vacunación</p> <p>Vacunación de viajeros internacionales: Grupos en los que se recomienda la vacunación previa a viajes internacionales</p> <p>Seguridad de las vacunas: Nuevos mensajes para la población general en relación con las notificaciones de acontecimientos adversos</p>
Nota Actualización 8	01/07/2021	<p>Reducción del intervalo de vacunación entre dosis en la pauta con Vaxzevria de 10-12 semanas a 8-12 semanas</p>
Actualización 9	18/10/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosis adicionales: Revisión evidencia y recomendación de administración en personas con condiciones de muy alto riesgo - Dosis de recuerdo: Revisión de evidencia y recomendación de administración en personas de 70 y más años y personas internas en centros residenciales de mayores - Coadministración de las vacunas ARNm con otras vacunas - Seguridad de las vacunas tras su autorización: Actualización de las fichas técnicas <p>Vacunación en embarazadas, puerperio y lactantes: Nuevas recomendaciones elaboradas con colaboración de FACME</p> <p>Vacunación con antecedente de infección por SARS-CoV-2: Reducción del intervalo de administración de la dosis a administrar en personas <65 años con antecedente de infección de 6 meses a 4-8 semanas después de la infección</p> <p>Personas de ≥ 12 años que permanecen sin vacunar: Completar la pauta de vacunación con vacunas de ARNm</p> <p>Vacunación en personas que han recibido una dosis fuera de la UE: Actualización de las recomendaciones</p> <p>Vacunación de viajeros internacionales: Posibilidad de que los Centros de Vacunación Internacional sean puntos complementarios de vacunación. Dejan de ser criterio para ofertar la vacuna la duración del viaje o la incidencia acumulada del país de destino</p>
Actualización 9 Modificada	02/11/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de la evidencia científica de las dosis adicionales y de recuerdo - Dosis de recuerdo: Administración de la mitad de la dosis habitual

		<p>en primovacunación de vacuna Spikevax en personas de 70 o más años de edad</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosis de recuerdo con una vacuna ARNm a todas las personas que recibieron una dosis de vacuna Janssen - Se puede utilizar cualquier vacuna de ARNm como dosis de recuerdo - Seguridad de dosis de recuerdo - Eliminación de la necesidad de esperar 15 minutos tras la administración de la dosis de recuerdo - Coadministración de vacunas: No es necesario guardar ningún intervalo temporal entre vacunas de COVID-19 y otras vacunas <p>Vacunación en personas que han recibido una dosis fuera de la UE: Actualización con la inclusión de nuevas vacunas</p>
<u>Actualización 10</u>	27/12/2021	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Actualización de la evidencia científica de las dosis adicionales y de recuerdo - Dosis de recuerdo en población de 60-69 años - Dosis de recuerdo a personal sanitario y sociosanitario - Dosis de recuerdo en personas internas en centros de atención a la discapacidad - Dosis de recuerdo en personas de 60 y menos años que recibieron pauta homóloga de Vaxzevria como primovacunación - Dosis de recuerdo en otros grupos de edad por debajo de 60 años (50-59 y 40-49 años) - Dosis de recuerdo en embarazadas - Dosis de recuerdo en personas que hayan recibido vacunas no autorizadas por la EMA ni disponibles en España - Dosis de recuerdo en personas con antecedente de infección sintomática o asintomática por SARS-CoV-2 - Información sobre autorización de la vacuna Nuvaxovid (Novavax) <p>Vacunación en población infantil: Resumen de la evidencia, aspectos a considerar y recomendaciones aprobadas por la Comisión de Salud Pública</p> <p>Vacunación con antecedente de infección por SARS-CoV-2: Posibilidad de administrar segunda dosis en personas de 65 y menos años que necesiten certificado de vacunación.</p>
<u>Actualización 11</u>	8/02/2022	<p>Vacunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Datos de vacunación en España - Nuvaxovid (Novavax): Información y evidencia científica sobre la vacuna (eficacia y utilización dosis recuerdo) y recomendaciones de utilización - Dosis de recuerdo: Resumen de todos los grupos en los que se recomienda dosis de recuerdo. Inclusión del grupo de adolescentes entre 12-17 años con condiciones de muy alto riesgo o que reciban tratamiento inmunosupresor <p>Evusheld:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resumen y evidencia científica del medicamento - Condiciones de riesgo candidatas por orden de prioridad - Recomendaciones para la selección de candidatos a recibirlo

		<p>Intervalo en personas con antecedente de infección por SARS-CoV-2:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dosis de recuerdo: Evidencia científica que justifica el administrarla a los 5 meses tras la infección - Población infantil: Se recomienda una única dosis en los niños que han padecido la infección por SARS-CoV-2 antes de la vacunación a las 8 semanas del diagnóstico de la infección. En aquellos que lo han padecido entre la primera y la segunda dosis, se administrará la segunda dosis a las 8 semanas del diagnóstico de la infección.
--	--	---

CSP: Comisión de Salud Pública. **Grupos de población a vacunar:** **Grupo 1.** Residentes y personal sanitario y sociosanitario que trabaja en centros de mayores y de atención a grandes dependientes; **Grupo 2.** Personal de primera línea en el ámbito sanitario y sociosanitario; **Grupo 3.** Otro personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de instituciones penitenciarias (**Grupo 3A.** Personal de ámbito hospitalario y de atención primaria no considerado de primera línea y personal de otros ámbitos que atiende sin mascarilla durante un tiempo superior a 15 minutos, **Grupo 3B.** Personal de otros colectivos enumerados en función del riesgo de exposición de la actividad laboral y la posibilidad de adoptar medidas de protección, **Grupo 3C.** Resto de personal sanitario y sociosanitario no vacunado con anterioridad); **Grupo 4.** Personas consideradas como grandes dependientes (grado III de dependencia, es decir, con necesidad de intensas medidas de apoyo) que no estén actualmente institucionalizadas; **Grupo 5.** Personas vulnerables por su edad, no residentes de centros de mayores (**Grupo 5A.** Personas de 80 y más años de edad (nacidas en 1941 y años anteriores), **Grupo 5B.** Personas entre 70 y 79 años de edad (nacidas entre 1942 y 1951, ambos incluidos) y **Grupo 5C.** Personas entre 66 y 69 años de edad (nacidas entre 1952 y 1955, ambos incluidos)); **Grupo 6. Colectivos con una función esencial para la sociedad,** desarrollando su actividad con carácter presencial, al menos una parte de la jornada (**Grupo 6A.** Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Emergencias y Fuerzas Armadas. Incluye Guardia Civil, Policía Nacional, Autonómica y Local, Bomberos, técnicos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, profesionales de Protección civil, Emergencias y Fuerzas Armadas, **Grupo 6B.** Docentes y personal de educación infantil (0-6 años) y educación especial, incluyendo tanto docentes como otros profesionales que atienden directamente al alumnado de centros autorizados por las CCAA como centros de educación infantil, de titularidad pública y privada y **Grupo 6C.** Docentes y personal de educación primaria y secundaria). **Grupo 7.** Personas con condiciones de muy alto riesgo; **Grupo 8.** Personas entre 60 y 65 años de edad (nacidas entre 1956 y 1961, ambos inclusive); **Grupo 9.** Personas entre 50 y 59 años de edad (nacidas entre 1962 y 1971, ambos inclusive); **Grupo 10.** Personas entre 40 y 49 años de edad (nacidas entre 1972 y 1981, ambos inclusive); **Grupo 11.** Personas entre 30 y 39 años (nacidas entre 1982 y 1991, ambos inclusive); **Grupo 12.** Personas entre 20 y 29 años (nacidas entre 1992 y 2001, ambos inclusive); **Grupo 13.** Personas entre 12 y 19 años (nacidas entre 2002 y 2009, ambos inclusive); **Grupo 14.** Personas entre 5 y 11 años.